



泡桐切幹

〔問〕：(一)泡桐宜何時栽植？

〔答〕：據說，泡桐種後第一年，要從土地面上鋸斷，由它再發芽。再選留一肥壯芽，使它生長，要連續兩年。否則將來泡桐長大後，它的中心是空的，不知是否真實？

〔答〕：(二)泡桐最好栽植時期：東部在國歷二月中旬至三月上旬，中部(西部)在十二月至一月下旬。

〔答〕：(三)泡桐定植後滿一年，宜切幹(從地面鋸斷主幹)一次就可，不必連續切幹兩年。

〔答〕：(四)泡桐主幹留五公尺，以上部分就可摘心，則可獲二公尺的木材兩段，上面還可長三、四橫枝，既符合市場需要，又可減少風害。(林文鎮)

農藥・肥料・殺草劑

混合新產品用法

〔問〕：近年來有所謂：

(一)硝化抑制劑。

(二)農藥肥料(肥料中加入農藥)。

料(指化肥)。

〔答〕：(一)緩效性(遲效性)肥料(指化肥)。

〔答〕：(二)硝化抑制劑。

此與尿素或硫酸銨等肥料混合施用，可減少硝化，使氮肥流失減少，提高肥效。

每公頃用量為二、六公斤，在旱田效果大於水田。

AM在酸性土壤使用或與過磷酸鈣等混合，效果較差。

〔答〕：(三)農藥肥料：即複合肥料中含有農藥，如賽文複合肥料，氣芬松複合肥料等。施肥可兼得殺蟲之效。

〔答〕：(四)緩效性肥料：有CDU，尿素甲脞，IBDU，裏硫尿素等。

施入土壤後，受微生物或土壤酸度及水分的影响而慢慢分解，釋出肥料成分，因此可以一次施用多量做基肥。

通常因肥效慢，另需加若干速效性肥料，以免作物初期發育不良。

〔答〕：(五)肥料殺草劑：有五氯酚尿素，五氯酚複合肥料，多谷尿素等，是將「五氯酚」，「多谷」等殺草劑混合

於肥料中製成粒狀，依肥料成分按照一般施肥量施用，但不應混入土中，否則殺草效果受影響。(洪維懷・蘇楠榮)



敵340

防治

柑橘：綠黴病、青黴病、蒂腐病。
香蕉：軸腐病、水銹、炭疽病、黑點病、黑星病。



美商默沙東(默克)藥廠出品
台灣總代理：新美公司
台北市中山北路二段96號 嘉新大樓902室
電話 548873 518348

*註冊商標

優良新品種、玉峯西瓜

(信豐研究農場出品)

玉峯西瓜乃是小型西瓜中比較大粒的品種，果重通常四至五斤，比一般小玉或小鳳西瓜有加倍，肉色深黃，子粒甚少，中部西瓜商則稱謂少子西瓜，甜份甚高，若待十分成熟才採食時比甘蔗還要高，又不空心，不易裂果，產量高，價錢獨佔最高峯。

為証明事實，我們已於五月十八，在二崙地區舉行過觀摩試食，深受各界好評，詳閱五月十九中央及中華日報均有報導，徵求各地經銷處。

玉峯西瓜子 台灣總經理處：

楊和種苗場 二崙鄉楊賢村二一六號
台灣種子之家 西螺鎮中正路一六九號

楊和種苗場是專門繁殖西瓜嫁接仔苗