



藍霉莖枯病病菌的孢子堆

六個較多，長度二八~一七四 μ ，寬度三·九~七 μ 。
分生子無色鞭狀，基部粗而呈圓形，鞭狀部為全長的三分之一或三分之二長，亦有短型者，多為直形，長型鞭狀者先端彎曲。
隔膜有〇~二十六個，以〇~十六個為多，分生子大小為一五·六~二一·五 \times 二·三~五·二 μ 。

防治方法

一般蘆筍病害防治簡要月曆。
(1)十二月~二月：配合施肥時施用「地立旺粒

- 劑」防治地下害虫（每公頃用二〇公斤）及地下害虫引起的萎凋。
- (2)二月間：配合晴天時期更新母莖，完成全面切莖清園，切莖應及地下一~二寸，並將老枝全部清除，搬離現場予以燒燬。
 - (3)二月上旬：配合灌溉，留母莖時期，施用「大生M四五」二五〇倍，或「大富丹」五〇〇倍，或「萬力」二、〇〇〇倍，或「毒敵」二、〇〇〇倍，加用殺虫淨二五〇倍。
 - (4)三月上旬：按照上述二月上旬的方法再施用一次藥劑。
 - (5)四月~五月：施用「二氯松乳劑」五〇〇倍及「病毒」五、〇〇〇倍液。（斜紋夜盜虫發生區，傍晚施用。）
 - (6)七月~八月：配合晴天時期更新母莖，切老莖，全面清園，老莖枝應搬離田間，並燒燬。施用「大生M四五」二五〇倍，或「大富丹」五〇〇倍，或「萬力」二、〇〇〇倍，或「毒敵」二、〇〇〇倍，加用「加保利」五〇〇倍，於母莖出土時施藥一次，隔十五天再施藥一次，計施藥二~三次。
 - 全面中耕、培土、完成排水系統，避免土壤空塞，以免免敗根立枯。
 - (7)九月間：噴「病毒」五〇〇倍（斜紋夜盜虫發生區，傍晚施用）及「二氯松乳劑」五〇〇倍液
 - (8)防治病害時並應注意下列各點：
 - ①應經常割除病枝並燒燬。
 - ②施用殺菌劑時應加用展著劑五、〇〇〇倍，以加強藥效。
 - ③雨季時應全面及時排水，以免敗根立枯。
 - ④大富丹施用時對某些人有過敏性，宜加適當防護，勿使藥劑噴及皮膚。



北市農藥登記字第1255號

ミリサイド

水和劑 50%

滅利蝨

水、白跳子、青跳子、飛蝨、稻、浮塵子、黑尾浮塵子。

使用倍數：1,000~2,000倍
包裝：300g \times 60包

製造元：有田化工株式會社

北市農藥登記字第1015號

チクサイド20%

治克蝨乳劑

水、白跳子、青跳子、飛蝨、稻、浮塵子、黑尾浮塵子。

使用倍數：800~1,000倍
包裝：500c.c. \times 20

製造元：東洋化學工業株式會社

原裝進口

現貨供應：**黎明貿易有限公司**
地址：台北市東園街320巷37弄1號3樓 TEL. 386895

中華民國六三年八月一日