



(四)死亡率多少？如何傳染？濕氣或空氣傳染？（神岡鄉大社村豐社路二〇巷八號潘誠義）

〔答〕：（一）依來信所說的症狀，判斷是傳染性下痢症，這是由於汎過性病毒所引起。

### 雨滴含氮肥

〔問〕：（一）下雨時，雨滴是否會混帶大氣中氮素下來，被作物吸收？

（二）灌溉水中混有上游紙廠排出廢水（煮樹皮的赤色水），漂白粉廢水，及染色料（紅色）廢水，對作物會發生不良影響嗎？  
（南投埔里鎮大城里水裡巷八號張有福）

### 猪流鼻血

〔問〕：肉猪偶然間會流鼻血？這是什麼原因？（台南麻豆鎮油車里一四四號邱俊清）

〔答〕：肉猪流鼻血，主要原因漂白粉廢水及染色料廢水，如混合量不多，對作物不會有不良影響，混合量多便有害。（蘇楠榮）

〔問〕：（一）我餵養三個餘月白種火雞，發生黃綠水性的下痢，嗉囊積水，廢食，衰弱死亡。此是何病？  
（二）如何防治？  
（三）有傳染性嗎？  
（火雞下痢症）

每年帶下來的氮量有每公頃二七五公斤，依地區而異，平均約九公斤，可以被作物吸收。  
（三）灌溉水中混有上游紙廠廢水、漂白粉廢水及染色料廢水，如混合量不多，對作物不會有不良影響，混合量多便有害。（蘇楠榮）

初期病狀如感冒、流鼻涕由淡至濃，稍後頻頻的噴嚏，噴出濃鼻涕有時有血塊，乃至大量的流鼻涕，最後從壞死、萎縮乃至脫落成空洞，最後從外面看，成爲嘴咬合不正或歪鼻。  
（博德桿菌很容易傳染二七四周齡的小豬，爲了豬場的衛生，有初期病狀的豬應早淘汰。（張聯欣）

〔問〕：（一）發現病雞應即時隔離，嚴密消毒雞舍器具。  
在夏季發生時應改良雞舍通風。  
冬季發生時，需注意保溫和換氣，增加抵抗力。  
（二）用金黴素（Aureomycin）或土黴素（Terramycin）防止惡化。  
（三）有傳染性。  
（四）斃死率一〇一—一五%。皆因食滯致死，屬接觸傳染。  
濕氣會增加罹病，所以應保持禽舍的乾燥。（唐清芬）


●強力・輕便

●省油・耐用



ロビン  
エンジン

樂敏牌



EY18B

農業、產業機械之動力源

二衝程・四衝程

製造元 富士重工業株式會社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓 TEL. 360740-362045

一馬力至二十馬力各馬力齊全