



鵝軟脚症

〔問〕：(一)鵝出生不久，脚部不能站立，用胸部坐，兩脚向後，此病要如何預防和治療？

〔答〕：(一)據所述，可判斷為軟脚症，是由於密飼，陽光不足，通風不佳及濕氣太重，或飼料調配不當所引起。

預防法：可將幼鵝放飼，使在有遮陰設備的室外曬太陽，自由攝取土壤中的無機物、鈣、磷等。

治療法：可於患病脚擦碘酒(一天二、三次)，再注射鈣質混合維他命D劑約〇.三CC於胸肌內，或在飼料中配合二、三%的骨粉。

〔民間傳說〕：小鵝被南風吹會軟脚，真正原因可能為梅雨期太潮濕，小鵝容易致病。所以鵝舍最好以木條釘成床架，使鵝不直接與地面接觸，以保持乾燥。(唐清奇)

瓠瓜管理

〔問〕：聽說瓠瓜加工後可作成玩具、酒壺，銷往日本、美國、香港等地，深受歡迎。關於瓠瓜的栽培有

下列問題：
(一)適合於何種氣候下生長？
(二)東勢是否適於種植？
宜何時播種？

〔管理上要注意什麼？
(東勢鎮中科里東崎街六〇號蔡敏雄)

〔答〕：(一)瓠瓜(又名匏瓜，台語叫做ㄅㄨㄞ仔)(扁蒲的一種)喜愛高溫、乾燥，在攝氏二五、二八度生育着果良好。

(二)貴地東勢的氣溫條件，三月中旬以後可以下種。

(三)管理與一般扁蒲栽培略同。

三要素的配合比率：氮素一三、一五公斤，磷酸一一、一三公斤，鉀一二、一四公斤。

如缺少磷，鉀素肥料，可以使用燒土來代替磷肥的不足，使用草木灰代替鉀肥的不足，就可獲得良好的結果。

在管理上應在本葉五、六片時摘心，留三、四枝的子蔓。

在貴地於五月日沒後夜蛾的活動較少，所以應在傍晚下午五時以後(夏令時間六時以後)施行人工授粉。(因瓠瓜在日沒後才開花)，儘量提高初期着果，以免瓜株生育過於茂盛，而減產。

子蔓開始伸長後應數草，以免瓜蔓與土壤接觸，以防瓜節發根。(王進生)



新世紀的正豐農藥!!

世界專利的綜合殺蟲劑!!

好年冬

現貨供應!! (加保扶) 粒劑

使用簡便 省工省錢
可與殺菌粉粒劑同時混合使用

※主治病蟲害

水稻：二化螟蟲、黑尾浮塵子、褐飛蟲、斑飛蟲、黃萎病、黃葉病、縞葉枯病。
食用油菜：蚜蟲、吊絲蟲、擬尺蠖。
蔬菜：地下害蟲。
馬鈴薯：蚜蟲、毒素病。

正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉民生路200號
台灣總代理：國際技術社股份有限公司

詳細說明書備索



三大特點：一、提高品質增加收成
二、增加抗寒抗病力
三、促進作物生長

認明商標 以防贗品

認明商標 以防贗品

正豐 WUCHSAL



水稻 荔枝 梨 柑 桔 蘋果 蔬菜 瓜類 豆類 的維他命

使用倍數
1000cc
500
1.000倍