



### 茶乙酸疏花果

〔問〕：豐年二四卷一〇期二四頁「批把產銷前途好」一文中，提到疏花及疏果的事項時說，「可採用茶乙酸化學藥品處理，即可降低生產成本」。請問：

〔答〕：此種藥品處理方法如何？

〔答〕：此種藥品何處在售？(台東卑南鄉泰安村一七二號黃禮賢)

〔答〕：(一)在批把幼果呈黃豆至花生米大小時，噴射茶乙酸(NAA)二〇ppm濃度於結果枝上，將可疏去不需要的花穗(留下幼果)，如此，只需在套袋前行一次選果工作。比較一般需人力行三~五次疏花疏果工作經濟不少。

為求安全確實起見，在未大規模使用前，先對數株行藥效觀察試驗，以免受樹勢強弱，風土等環境因素影響效果。

〔在規模較大化學藥品行均可購到。〕(范念慈)

### 木耳下種洒水

〔問〕：(一)木耳菌絲是否已伸入木材中，能否由外表看出？

〔答〕：使用普通油桐樹種木耳，菌絲大約幾天可以爬好？

〔接種後，須用塑膠布蓋着嗎？要不要每天打開？

〔砍下的木材，大約要幾天後才能下種？

〔菌絲爬好後，一天洒幾次水？

〔最適合木耳生長的溫度是幾度？(雲林元長鄉和北路8號李德樹)

〔答〕：(一)木耳菌絲在原木中的生長狀況，可用手指壓檢，若有彈性，就是有菌絲伸入原木。

〔四英寸直徑、四尺長的原木，大約需要六十~八十天。

〔下種後需要用塑膠布覆蓋保持水分。大約一~二星期開一次檢查即可，不要天天打開。

〔砍下來的木材，可以立即切成段木，當天下種。最長不可拖延七~十天，否則太乾。

〔看氣候洒水，若木耳下垂無力狀時就噴水，大約二~三天噴一次即可。

〔最適合木耳生長的氣溫為攝氏二五~二八度。(杜自選)

### 蝦的種類

〔問〕：(一)淡水蝦苗何處有售？

〔我的池塘約三百坪，混養草魚(一千尾)、鯉魚(數尾)、吳郭魚(數十尾)及土殺(四百尾)可否再混養蝦類？

〔池塘有泉水，終年不乾涸，水深約六十公分，水質乾淨，是否適於養蝦？

〔蝦類有幾種？價格每斤多少？

特別注意之處？(苗栗苑裡鎮山柑里五三號王凱民)

〔淡水蝦苗目前本省尚無出售處，但已見籌設繁殖淡水蝦苗場。

〔不宜混養。

〔你的池塘可以養淡水蝦，但苗堅可能水溫偏低，要注意。

〔海水蝦有草蝦、沙蝦、斑節蝦、紅蝦、白蟻蝦等；淡水蝦有過山蝦、泰國長腳大蝦等。價格因成苗或幼苗，因時、因地、因天然捕獲或人工養成而有差異。

〔淡水蝦為雜食性。管理上要注意避免互相殘食，逃逸及水溫太低，水質太壞。(廖久久)

### 楊桃不結果原因

〔問〕：我種的楊桃，剛買來種時，結果很多。但第二年就不結果了。直到現在已經五年，每次都開很多花，但始終見不到結果。請問：

〔原因如何？

〔是否與整枝有關

〔開花為什麼會乾掉？要如何防治？用何種藥？

〔不會結果是否與噴農藥有關？用何種藥防治？

〔楊桃品種，目前推廣的是何種？(嘉義瑞梅山鄉圳北村麻園寮

三三號郭義華)

〔答〕：(一)楊桃開花很正常，以前會結果，現在不結果，這與楊桃本身無關。

〔整枝並不會影響結果。

〔開花後乾枯，是不結果的原因所在，並可能與噴藥不當(濃度太高)有關。

任何果樹開花時，不可噴用殺虫藥劑，以免妨礙昆蟲授粉。

〔楊桃果實發育至中期以後，容易受果蠅為害，需每日噴一、〇〇〇倍的「速滅松」一次，至採收前一星期停止。

〔目前在台灣栽培的楊桃品種以五十頭，白絲機，歪尾等較普遍，各有優點。(張振甫)

# 敵 340

## 防治

柑橘：綠黴病、青黴病、蒂腐病。  
香蕉：軸腐病、水銹、炭疽病、黑點病、黑星病。



美商默沙東(默克)藥廠出品  
台灣總代理：新美公司  
台北市中山北路二段96號 嘉新大樓902室  
電話：548873·518348

\*註冊商標