



夜蛾防治

〔問〕：我的「愛文」芒果園，最近發生一種刺吸性夜蛾類，果實受害嚴重。我想要設置「誘蛾燈」（捕虫燈）防治。請問：

（一）如何設置？

（二）開燈時間，何時最有效？（雲林元長鄉龍岩村五二號吳恒茂）

〔答〕：（一）據調查，台灣為害果實的刺吸性夜蛾類共有十八種。這類夜蛾多數為大型，且大型的為害比較嚴重。多分布在山丘及山麓地帶。為害的果樹以柑桔類、芒果、葡萄、水蜜桃、楊桃、木瓜、梨、枇杷等為多。

防治方法目前還無一種理想的。以誘蛾燈驅除，並非有效方法。過去日本有此類報告，以六〇W螢光燈，每三〇公尺左右點一燈。有些夜蛾有避光作用，但有些反有引誘作用，利弊各半，且多類夜蛾不起作用。

也有以硫磺粉加BHC拌合木屑在果園中點燃冒煙，以煙霧驅除，此也只有部分有效，且需天天點用。

也曾有人用一種日製避忌藥「夜蛾眠」噴施，因臭味使夜蛾走避不來，但效果也是不理想。所以到目前為止，尚無良策對付。

如果你有興趣可自行做小規模試驗。並參考夜蛾習性採用試辦。

（二）刺吸性夜蛾均在日落後開始活動，活動為害最盛是在日落後一小時至十時之間，午夜二時左右，仍有它的踪跡。所以防治應以它活動時間開始，即採用防治方法，但要徹底防治是很困難的。（張良傳）

木耳綠黴菌

〔問〕：（一）以榕樹幹種的木耳發現有雜菌（首先出現白色粉狀，後來變成綠色粉狀），木幹表皮漸呈黑色而剝落，此枝木幹木耳無法生長，木耳死亡，這是何病？如何防治？

（二）以木屑及米糠種的菇類，發現類似果蠅的小飛虫，這是何虫？如何防治？（彰化縣大城鄉東城村東平路一八號吳焦贊）

〔答〕：（一）白色粉未狀，後轉青綠色的是綠黴菌，在氣溫高時易發生，請使用「霉敵三四〇」殺菌劑（美國新美公司出品）或「萬力」（美國杜邦公司出品）各稀釋成：「霉敵三四〇」七五〇倍，「萬力」一、五〇〇倍，噴射二、三次，發生嚴重的部位，特別增加噴射次數，但不可增高施藥濃度。

（二）所說的害虫是黑翅菌蟻，專食用菌絲。可使用DDVP的原液吸於棉花或破布中，用線吊在通風機前，將藥氣吹入木耳寮內即可防治。（杜自選）

註冊商標

劑養營物植
露豐正
WUCHSAL

水稻
荔枝
梨
柑
桔
蘋果
蔬菜
瓜類
豆類的維他命



使用倍數
1000cc
500
1.000倍

三大特點：
一、提高品質增加收成
二、增加抗寒抗病力
三、促進作物生長

「認明商標以防偽品」



新世紀的正豐農藥!!

世界專利的綜合殺蟲劑!!

好年冬

現貨供應!! (加保扶) 粒劑

使用簡便 省工省錢
可與殺菌粉粒劑同時混合使用

※主治病蟲害

水稻：二化螟蟲、黑尾浮塵子、褐飛蟲、斑飛蟲、黃萎病、黃葉病、縐葉枯病。
食用油菜：蚜蟲、吊絲蟲、擬尺蠖。
蔬菜：地下害蟲。
馬鈴薯：蚜蟲、毒素病。

正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉民生路200號
台灣總代理：國際技術社股份有限公司