

茶花：盆栽寵物

楊紹澤

宋代劉克莊的後村居士集記載：「青女行霜下曉空，山茶獨殿衆花叢，不知戶外千林縞，且看盆中一本紅，性晚每經寒始折，色深却受日微烘，人言此樹尤難養，暮澗晨澆自課童。」這段話證明我國古人愛好茶花，而且茶花的盆栽早於宋代，就已受到重視了。

品種選擇

山茶 (Camellia Japonica)：山茶的葉片，有着光亮的色澤，質厚，具有高雅的氣質。花期久，花色花形變化萬千，粉色花系的「廣東粉」、紅色花系的「荔枝茶」、白色花系的「白牡丹」、混合色系的「十八學士」，都是適於盆栽的優良品種。

茶梅 (Camellia sasanqua)：茶梅的葉片細小，色澤美麗，由淺綠到濃綠，枝條柔軟，樹姿嫵娜，有秋季花木代表的美稱，在台灣栽培的品種如「八重梅」、「白雪」、「粉紅裝」、「吉美」都是世界有名的盆栽材料。

雪茶 (Camellia rustica)：樹形呈灌木狀，葉片美麗，花朵奇異，多數的品種，有着大而美麗的花朵，「松上臘脂」就是非常優異的盆栽材料。

肥後茶 (Camellia Japonica L. Var. Hortensis

）：本種類的茶花品種，不但具有美麗形態的花朵，而且葉的顏色也美，枝幹蒼勁古姿，特別適作盆栽之用。我會引進本種類的茶花品種，予以馴化栽培，結果生育優良，如國之譽、日本錦、紅梅、滿月、不二、昭和之光，都是甚為有名的盆栽品種。

盆栽方法

灌水：茶花灌水，少量為宜，因盆土經常潮濕，會引起樹根腐爛，以及花蕾掉落。如果過於乾燥，也會引起落蕾或生長不良。春季新芽發齊時，減少灌水，如灌水過多，會促進新稍徒長，到了五月稍微減少灌水，則有培養樹枝節間緊密的功用。

茶花的新枝葉到日暮以後，當幼芽彎曲不直立時灌水為宜，如梅花的花盆，在促進新芽萌發而不引起落葉的程度下酌減給水，促進花芽的分化，到六月中旬花芽分化為止。

盆栽茶花在春季新芽伸展

時，水分的調節，很不容易。茶花不可依摘心的方法來抑制枝條的生長，因茶花的花蕾着生在當年生枝條的先端，及其二、三葉腋間，所以，摘除當年生的枝條就不能結蕾。

換盆：茶花的根很容易硬化，而且新根脆弱易斷，每年或隔年要換盆一次。換盆時，如果用竹篾鏟除根土，會折斷樹根，要利用尖刀切開根上周圍，再用竹篾輕微的剝除，以不傷害樹根的程度輕輕的弄鬆，露出根羣。

換盆的時間，以春分過後新芽伸長之前為適期，有人主張在雨季中換盆。但此時期雨水積於盆內，會引起樹根腐爛及損傷新芽，如要在久雨時期換盆，應該將盆置於溫室內。

花後處理：開花後花葉盡早除去為宜，否則會消耗樹力。開花之後應該立即施肥，同時也須注意枝條的整理，除去不必要的新芽，不然次年的花朵會變小。

過於伸長的枝條，會破壞盆栽的樹姿，所以各枝幹從基部起保留二、三枝新芽外，剪除其頂端。同時會影響樹姿美觀的枝條，也要由基部除去，六、七月間從新剪後的枝條伸長新芽，四月長出新芽時要減少灌水，就不會過分伸長，而花芽的分化也會良好。

六月起到九月間，從這些枝條分化花芽及葉芽，花蕾也慢慢的長大時，可酌量減水，

每枝條保留一個花蕾即可。

肥料：盆栽茶花的用肥，以油粕類為主，但是盆栽是將茶花植株栽培於有限的盆土內，要求開美麗的花朵，而且還要保持有光亮的濃綠葉片，就不是一件容易的事。油粕含有豐富的窒素、磷酸及加厘稍少，因此作為茶花的盆栽用肥，需要加入骨粉、米糖、過磷酸石灰，補充磷鉀之不足。同時加入草木灰、氯化鉀，補充鉀肥之不足。

茶花栽培時，關於三要素肥料的施用比率應為氮：磷：鉀＝五：三：二。

茶花盆栽用肥的時期，要在花後立即施用多量的肥料，以促進其充分樹勢的恢復，五、七月間不可施用任何的肥料。因為於花芽分化時期內施肥，在分化過程中的花芽，很容易恢復營養生長變為葉芽。

整枝：盆栽茶花與其他的茶、樹不同，如松樹等的盆栽，是描寫遠景的風格，而相對的茶花盆栽，則是描寫近景的風格，不但要以自然的古木觀賞，而且更要欣賞其花朵。

茶花的花蕾着生在當年生枝條的先端，因此不能以摘心或修剪方法整枝，要使

樹姿美觀，必須要用誘引的技術。

誘引所用材料是鐵線或銅線，而鐵線的粗細是依枝幹的大小而定，通常是選用八號到二〇號的數種備用為宜，長度以三〇公分到六〇公分即可。誘引時，鐵線的首尾要固定於枝幹，捲緊鐵線的間隔必須保持中庸，不能過疏，但也不能過密。

枝幹彎曲的方向，必得與鐵線捲緊的方向相同，即向右彎曲，否則就無誘引的效果。

茶花的盆栽，不僅是木本花卉的盆栽代表，也是觀賞樹木的盆栽寵物為今日世界盆栽植物的主要材料，故盆栽茶花的展望，可以說是前程似錦。



蘇鐵樹下 (白新理)