



### 肉乳牛品種

〔問〕：(一)飼養肉牛和乳牛各以何種品系較優良？價格約多少？  
 (二)乳牛要多少時間才能開始產乳？產量每天約多少公斤？

〔答〕：(一)在臺灣較好的肉牛品種是純種聖達牛及聖達牛與本地黃七雜交的雜種牛。  
 (二)乳牛品種則以荷蘭牛為優。

現在肉牛活體重，每公斤約四〇至四五元之間。  
 乳牛在各牧場可能有售，但不易買到很好的。  
 普通每日產乳約一〇公斤的母牛，現在約二、三萬元一頭，看健康及繁殖情形而定。

(一)普通乳牛生後約十八個月配種。妊娠後經過約二八〇天生小牛，即可產乳，可繼續產乳約十個月，每天產乳一〇至三〇公斤。  
 (二)每分地牧草養多少肉牛，要看牧草生產情形而定，普通一頭二百公

斤的肉牛，平均每天約需牧草二〇至二五公斤(包括損耗)。  
 (三)牛用的尿素與肥料用的一樣，糖蜜出產於台糖各糖廠，目前每公斤約一·五元，依地區而異。  
 普通飼料中可用糖蜜一〇至一五%，尿素用一、二%。

### 牧草養雞

一頭牛一天可食糖蜜一、二公斤，尿素視牛的大小而異。(黃立羣)

〔問〕：(一)狼尾草、盤固拉草、營多藤是否適合養土雞？  
 (二)栽植要點如何？(宜蘭市民權新路二一號林金榮)

〔答〕：(一)狼尾草、盤固拉、營多藤均可喂土雞，但需幼嫩的才願吃，否則需曬乾製粉當青料，或用搗潰器(攪碎器)壓搾成汁後，拌飼料飼喂，但較費工。  
 (二)狼尾草用二節或三節的莖扦插繁殖，行距三〇至五〇公分，株距三〇公分，不宜像種甘蔗般的起畦，亦不必培土。

如種在排水不良的水田，應做寬二公分，高三〇公分的平畦，上種四行或五行。在海拔一、五〇〇公尺的高山亦能生長良好。  
 植期：五月。  
 利用季：四、十月。

盤固拉  
 供放牧或青



割均可，如用於調製乾草或切短後青儲也很適宜。  
 三月至七月用切成二節至四節長的匍匐莖扦插，行距五〇公分，株距三〇公分。每公頃可產六、十二萬公斤。海拔五〇〇公尺以下的各種土壤均可種植。

營多藤可用播種或扦插法繁殖，最好先播在苗床上，等株高半公尺時，移植田間。  
 海拔一、〇〇〇公尺以下可種植，但土質宜為輕鬆土，如沙壤土及高山的石質土。  
 植期：五月。

你如有意播種，可就近請教宜蘭縣政府畜產股郭清通課長或羅浴沂獸醫。或來鳳山市王生明路八五號「台灣省畜產試驗所高雄雄畜繁殖中心」參觀。(唐清岑)

### 菱角栽培要點

〔問〕：(一)菱角宜種在何地？  
 (二)栽培要點如何？(彰化縣田尾鄉福田村光復路二〇之一陳一徵)

〔答〕：(一)菱角栽培均利用池沼或潭子為主，但亦可利用水田種植。  
 (二)栽培要點如下：

(1)行株距約為七五至九〇公分。  
 為防止腐敗病起見，栽培前先撒施石灰。  
 (2)生育期注意經常保持一定的水深，並使池沼的水流動，以免發生腐敗病。  
 (3)施肥管理須視肥沃程度而定。初期每一〇公畝施用過磷酸鈣六〇至七〇公斤，生育中期施用鉀肥二〇斤左右較宜。

貴鄉離開元長鄉不遠，可利用機會到實地觀摩，必可獲得實際的心得。(王進生)

### 木瓜防風

〔問〕：(一)颱風季節，木瓜應怎樣預防風害？  
 (二)木瓜葉和木瓜生長是不是有關？可否剪少些？  
 (三)木瓜成熟時會有一處一處黑斑，應如何防治？  
 (四)種木瓜需不需噴農藥？(彰化二林鎮中西舊二路8號沈朝章)



〔答〕：(一)木瓜預防風害方法有：  
 ①選避風地，  
 ②設防風林，  
 ③倒株栽培，  
 ④採用春植，  
 ⑤插立支柱(颱風來臨前)。  
 (二)木瓜葉與生長狀態有關。葉愈多表示生長愈旺盛，但營養生長太旺盛時，反而無益，會使生殖生長受阻，結實不良，且植株很快高大，易遭風害。  
 為避免養分消耗，底層老葉及陽光照不到的葉最好剷除。  
 (三)木瓜成熟時果皮上有凹陷的黑斑，是為「炭疽病」，宜每一、二周噴「大生M-45」四〇〇倍一次防治。  
 (四)木瓜對農藥敏感性很大，劇烈性農藥或濃度太高就會產生藥害。但為防治各種木瓜病虫害，仍需經常適當的噴藥。(王德男)

# 遺產稅補報期限 64年6月30日

的印章？

其中二人已逝世，是否又須她們的子女全部印章？側聞遺產繼承登記至明(六四)年六月底以前仍未辦妥者，要受處罰，是否屬實？

律師答覆：  
令祖父在台灣光復後過世，依我國民法第一一三條第一款，第一一四一條諸規定，所顯示男女平等之精神，你父親及你姑母，皆有遺產繼承權。除非你的姑母於知悉其得繼承之日起二個月內，曾以書面向法院、親屬會議或其他繼承人表示拋棄繼承權，否則按人數平均繼承。每人均只得四分之一(同法第一一七四條)。

你的姑母有二人已去世，其應繼分由其子女及夫共同繼承。

辦理繼承登記應先申報遺產繳清稅費，附具印鑑證明書、戶籍謄本、系統表、聲請書、所有權狀等一應書件，可親自或委託代書向管轄地政事務所洽辦。  
依舊遺產稅法第十七條，被繼承人死亡遺有遺產者，納稅義務人(即繼承人)應於繼承開始之日起三個月內，向該管稅捐機關申報遺產稅。依新遺產及贈與稅法(六十二年二月六日公布實行)第廿三條，則應於六個月內申報。  
如未依限申報原應各依罰則處罰，但政府為鼓勵自動補報，於本(六三)年六月廿九日根據遺產及贈與稅法第五十七條第四項，特別訂定遺產稅補報期限及處理辦法，其第二條明載：前已發生的遺產繼承，未能辦理繼承登記，致未申報遺產稅的案件，准於民國六十四年六月三十日以前，陳述未依法申報的特殊原因，自動據實補報，經主管稽征機關核准者，應免處罰。



台北市南京東路  
陳說女士問：自六十年一月到六月，半年的租賃所得稅代扣稅款未按时繳清，現經北地方法院裁定罰鍰銀元五十元，並限十天內繳納。不知要到什麼地方去繳罰款？如果超過十天，會不會再受罰？

警察電台法律顧問張  
龍文律師答覆：法院財務法庭規定罰鍰，可持款前往財務法庭接洽繳交罰款。超過規定期限，財務法庭將派員強制執行，不過罰鍰數額相同。

## 罰款逾期不交 法院強制執行

## 红柿落果

〔問〕：我所種的红柿，每年結實很多，但是每次下雨後，落果很嚴重。

今年此地下了三次大雨，果實落約八〇%，此要如何防止？  
(台東東河鄉尚德村七塊厝范玉華)

〔答〕：红柿一般都有落花落果的習性，程度視品種而異，以「四周柿」落花果較少，產量常較高。落花落果的原因與受粉以及親和性有關。

為保持可靠產量，最好種產量高的品種，如四周柿。  
開花與着果初期，如天氣過於乾燥，可引起落花與落果。  
幼齡樹常受粉較困難，落花落果情形較嚴重。樹齡較大後結果較正常。(張振甫)

## 西非種棉花

〔問〕：(一)適合在西非種植的棉花有幾種？  
(二)在台灣現有育成優良的棉花種子，何處有售？  
(三)在熱帶地區，棉花的播種期為何時？

(四)棉花育苗期多久？  
(五)棉花的灌溉程度如何？與種植番茄的灌溉有何異同？  
(六)棉花的種植畦高、畦距、株距各為多少？  
(七)棉花種後多久才可收穫？棉株呈現何種情況為最佳收穫期？

(八)收割棉花時，是整株連根拔起，或只摘取棉子，然後掘取餘莖？  
(九)用台灣出售的「大豆播種機」來播種棉花適用嗎？  
(十)在熱帶地區，每年可種幾次棉花？  
(十一)每分地(十公畝)每次(即每季)可收棉花(淨棉)多少斤？(香港九龍官塘新區第十座六樓五一七號馬華英)

〔答〕：(一)西非國家種植的棉花有許多品種如 Allen 151, Allen 333, Mono 60, Hyfi, BJA 592, Crak BC-3, Réba B 50, Allen A333-57, Allen A333-61, D-9, Samaru 26J, HL-1等。

(二)台灣育成的優良棉花種子，可向台中縣新社鄉農林廳種苗繁殖場購買。

(三)在熱帶地區，棉花的播種期依地區而不同。有的是春播，有的是秋播。

(四)棉花不需育苗。  
(五)棉花灌溉與番茄不同。灌溉程度視當地氣候而定。

(六)棉花種植的畦距為八〇~一〇〇公分，株距三〇~四〇公分，畦高約二〇公分。

(七)棉花的收穫期約為播種後四個月。棉株呈現蒴果開裂吐絮時，即可陸續採收。

(八)收穫棉花不是連根拔起，而是收穫採收棉花後拔株。

(九)用「大豆播種機」不適用用來播種棉花。  
(十)在西非種植棉花是每年一次。  
(十一)西非棉花產量每分地平均可收淨棉一五公斤左右。(熊光斗)