

腫脹，背向下反轉游泳。是保持平衡的魚鰾氣體調節機能失效所致，無傳染性。

治療法——

(1) 用針筒插入體側鰾內抽去氣體，然後養入溫暖水中，投以少量生餌。

(2) 有時並非鰾病而是腸炎等所致。可以腸炎方法治療。

魚虱：為直徑約四公厘左右的圓形扁平甲壳類動物。體透明，有二個吸盤吸着魚體，注入毒液而

吸取血液。使魚體衰弱。吸着部位表皮損傷，出現血斑。容易感染其他寄生蟲病。症狀嚴重時靜止於水面附近不動，肉眼可以看出虫體。

治療法——

(1) 將魚兒取出除去之，傷口塗以紅藥水。

(2) 池水中加入BHC水和劑二百萬分之一。

(3) 池水中加入五〇%馬拉松乳劑一百萬分之二，約五日可根除。

(4) 池水中加入五十萬分之一過錳酸鉀，每周加

果菜插花極富情趣


一般人談到插花，總認為不外是一些花卉草木，而忽略了利用蔬菜和水果，因蔬菜也是很好的材料，而且往往超越一般花卉之上，甚富情趣。茲提出數種方式供大家參考：

- 方形塑膠盤內，將六隻新鮮的青椒排成塔狀，再以鮮紅的小蘿蔔點綴其間，青艷獨時。
- 深底玻璃瓶倒置，內裝檸檬和小番茄，四周放小碟子，也排上檸檬和小番茄，古典幽雅。
- 方形合成鍋內，放滿紅皮馬鈴薯及帶壳的板栗，具有濃厚鄉土風味。



- 採用中國甘肅或是高直，層層疊在玻璃盆內，在中間小心安置幾支點着蠟燭，特殊實用。
- 金屬盆放在金色托盤內，以綠色花菜為主材，中央插立六根露筴，再以紅菊花插入空隙中，並在托盤四周擺置蘋果和柑橘，賞心而悅目。
- 使用一隻廣口玻璃罇，下填綠色的青豆，挑選大支的蔥苗，深埋豆內，然後視空隙加插數朵矢車菊。白黃蕊、綠莖四展，清秀怡人。
- 在原色木桶內，放入青菜葉子為底，然後利用細竹枝將胡蘿蔔、紫色包心菜、奶油色花菜染菜插入。

——新欣取材自 6, 1974 Woman's Day



果菜插花

入一次，重複三次可根除。(註三)

錨虫：為長約一至二公分白色線狀寄生蟲。頭似錨狀咬入魚體吸血，下體垂於外。在魚體寄生時很容易看出。症狀與魚虱同。

治療法——與魚虱同。

腐尾病：稚魚擁擠的魚池易發生腐尾病，為害稚魚甚烈，有時成魚也會被傳染，開始時祇是在尾鰭上出現血斑，繼則發生腐爛。似擦傷狀，實則已為細菌侵入。如不予治療，鰭膜全腐，只剩下一列鰭條，至接近基部即不治，有傳染性，要隔離消毒(註一)。

治療法——

(1) 用紅藥水抹擦患處後養入一%食塩水中。至癒為止。

(2) 將病魚放入十萬分之一過錳酸鉀溶液中約一小時，每日一次至癒為止。

鰭部瘀血：此為金魚最易發生的疾病。尤以鰭部發達的優良品種為甚。鰭長缺少循環，抵抗力弱。起病原因為水溫激變，餵飼過量。初則鰭部變紅，繼則分裂，以尾鰭更為顯著。有傳染性，要隔離消毒(註一)。

治療法——與腐尾病同。

外傷：(註三) 魚兒外傷要立即治療，否則容易發生水棲菌。

治療法——

(1) 輕微者塗紅藥水即癒。

(2) 較重者養入每加侖水中加入四萬單位盤尼西林或金黴素五十公毫的溶液中，至癒為止。

註：(一) 魚池及用具用一%石灰水或食塩擦洗。未感染的魚兒養入〇.五%食塩水中或八十分之一甲基藍溶液中約一周。如不再出現白點病，即可恢復養入清水中。

(二) 醋酸三六%，冰醋酸九六%的純度為標準。

(三) 參照王元林先生編著的熱帶魚飼養法的附錄「金魚的疾病」。

(四) 據廣岡義雄氏的報告，鱗立病由便秘引起。其四歲之文魚用第三法治癒，三歲的東錦用第三法治癒。