



鵝神經麻痺症

〔問〕：我飼養二十隻小鵝，有二、三隻癱瘓，二隻腳像抽筋似的不能站也不能走，時好時壞，這是何因？如何防治？（台北縣中和鄉景新街一七八巷三九號李日庚）

〔答〕：如全羣鵝均發生此現象，且糞呈黃色，乏食慾，這是跛足症，很快就死亡。

但如食慾照常，只是腳弱不能步行，這是一種神經麻痺症，引起此症的因素有：

(1) 缺乏維他命D，骨骼生成遲慢，發育也隨着遲緩，所以顯出腳弱現象（似腳底受傷，怕踩地），最後無法支持身體，不願行動。可給二、〇〇〇單位維他命A與三〇〇〇單位維他命D的魚肝油〇・五%補足。

(2) 骨頭的生成與維他命D、鈣、磷三者都有相互關係，三者中不許有一種在必需量以下，需均衡配合才能發生效力。

飼料中以貝壳粉、肉骨粉、魚粉富含鈣、磷。

鈣、磷的營養需要量通常為鈣一%，磷〇・六%。

(3) 缺乏之錳，幼鵝膝關節脫離而發

生神經障礙，行動癱瘓，幼鵝對錳需要量雖少（每磅需28mg），但絕不可缺乏。

(4) 缺乏維他命B₂：初期症狀，蹣向內側彎曲，形成拳頭型，後期兩肢投出，向兩側倒臥，行動不便。

以10mg的維他命B₂，接連注射五天可癒。苜蓿草、蔬菜富含維他命B₂。

要預防此病，最好放飼在有遮陰設備的場地，使自由活動，曬點太陽，並供給足夠的貝壳粉與肉骨粉。已發生症狀的，需隔離飼養，才不會被健康的鵝踩踏。（唐清岑）

網室蔬菜栽培

〔問〕：(一)網室蔬菜栽培為何以二或三分地為宜？

(二)溪水可否用來灌溉網室栽培的蔬菜？

(三)網室蔬菜栽培為何較不適宜栽種葉菜類、果菜類及根菜類？

(四)過鹹的土地及近海的鹼地對於蔬菜栽培有何影響？（台南縣下營鄉宅內村二一八號曾文興）

〔答〕：(一)網室搭建面積如超過〇・二公頃（即213分地）以上，因結構的關係，全棟網室對於風力的抵抗力差。

(二)清潔的溪水可用於網室栽培蔬菜。

(三)網室因會遮光，光度差，對於短期葉菜類的生育影響不大，但對於長期性葉菜類就發生影響。尤以需充分陽光的葉菜、果菜、根菜類影響更大。

有充分的陽光，葉菜類才有肥嫩

的莖部，果菜類才有良好的着果，根菜才有肥大的食用根。所以網室栽培不太適宜。

(四)過鹹的土地會影響蔬菜根部的發育，靠近海邊因有潮霧，會帶來鹽分，傷及蔬菜的莖部或影響葉部的水分蒸發和呼吸作用。（王進生）

玉米優良品種

〔問〕：(一)台南十一號玉米有何優點？

(二)幾級風力會吹倒玉米？抗虫害較強的玉米有那些？

(三)產量較豐的玉米有那些？

(四)種子何處有售？價格如何？二地須多少種子？（嘉義民雄鄉頂崙村一〇號劉鴻賢）

〔答〕：(一)台南十一號玉米主要優點是抗露菌病，產量和台南五號一樣高，且早熟、耐旱、豐產。

(二)颱風六級以上，一般玉米都會被刮倒。

(三)抗虫害的品種目前還未育成，但可調整每年四月、八月不種玉米，其他月分虫害較少，可用農藥防治。

(四)產量較豐的玉米有雙雜交玉米台南五號及十一號。

種子可向台中新社鄉大南村農林廳種苗繁殖場洽購，政府亦規定全省農會推廣代售。

每公斤種子費約三〇元，二分地要五公斤種子。

（陳振耕）

雞糞作肥料

〔問〕：(一)雞糞、豆餅作肥料時，可否直接使用？

(二)何時施用較好？（屏東春日鄉古華國小劉化之）

〔答〕：(一)雞糞、豆餅作肥料時不宜直接使用。

用前需要堆積，加水發酵後施用較妥，因為在分解過程中會產生對根部有不良影響的物質。

但如施用數量很少時，可不必堆積。

施用時也須要與土壤充分混合。

(二)施用時期以春夏季較適宜。（吳啓東）

敵340

防治

柑橘：綠黴病、青黴病、蒂腐病。
香蕉：軸腐病、水銹、炭疽病、黑點病、黑星病。
蘆筍：褐斑病。



美商默沙東（默克）藥廠出品

台灣總代理：新美公司

台北市中山北路二段96號 嘉新大樓902室

電話：548873 518348

*註冊商標