

氨基甲酸鹽系劑殺虫劑施用表 (I)

孫定國·易筱琪

農藥	化學名稱	毒性	劑型	含量	使用方法·範圍	商品名稱	
						英文	中文
加保利	1-Naphthyl-N-methylcarbamate	500~700	WP	50%	水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 500倍 2.0~2.4公斤/公頃 水稻黑椿象 500倍 1.6~2.0公斤/公頃 甘薯根亮天蛾 500倍 2.4~2.8公斤/公頃 花生小綠浮塵子 500倍 2.0公斤/公頃 大豆椿象類白綠蚜蟲及夜蛾幼虫 500倍 4.0公斤/公頃 玉米螟 500倍 2.4~2.8公斤/公頃 高粱穗夜蛾 500倍 1.6公斤/公頃 蔬菜擬尺蠖 1,000倍 蔬菜黃條葉蚤、蔬菜黃守瓜 500~1,000倍 番茄夜蛾 500倍 菜豆豆莢螟 1,000倍 茶避債蛾類 300倍 3.0公斤/公頃 茶卷葉虫類 500倍 2.0公斤/公頃 茶浮塵子、茶蠶、茶毒蛾 800倍 1.25公斤/公頃 茶小白紋毒蛾 300倍 3.3公斤/公頃 柑桔椿象類 500倍 4.0公斤/公頃 烟草青虫斜紋夜盜虫及其他鱗翅目幼虫 500倍 10公克/10坪(烟草苗床) 0.5~1.2公斤/公頃(烟草本圃) 鐘麻小造橋虫 500倍 2.0公斤/公頃 黃麻擬尺蠖 1,000倍 750公克/公頃 棉蚜浮塵子 500倍 1.6~2.4公斤/公頃 棉鈴害虫 500倍 2.0~2.4公斤/公頃(生長中期) 2.4~3.0公斤/公頃(生長後期) 松毛虫 300~500倍 松綠葉蜂 500倍 水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 1,000倍 0.8公斤/公頃 香蕉粉介壳虫 500倍 菜豆豆莢螟 1,000倍 芒果螟蛾 500倍 2.55公斤/公頃	Sevin	賽文
				WP 85%	按50%比例增加希釋倍數	Carbaryl	治虫寶
		D 1.5%		水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 40~50公斤/公頃 水稻黑椿象 40~50公斤/公頃	Denapon	大克虫	
					Dicarbam	新速文	
					Carbamate	加巴美	
					Sevimol 4		
虱必殺	2-Chlorophenyl-N-methylecarbamate	150	WP	50%	水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 250倍 0.8~1.2公斤/公頃 (動力微粒噴霧機噴藥) 2,000倍 0.5~0.6公斤/公頃 (人力噴霧器噴藥)	Hopeide	效果強
				EC 20%	水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 800倍 1.2~1.5公升/公頃	CPMC	禾養生 好撲滅
必克虱	(1) m-(1-Methylbutyl)-phenyl-methylcarbamate (2) m-(1-Ethylpropyl)-phenyl-methylcarbamate	87	EC	25%	水稻黑尾浮塵子、褐飛虱 1,000倍 1.0~1.2公升/公頃(人力噴霧機噴藥) 250倍 1.25~1.5公升/公頃(動力噴霧機噴藥)	Ortho Bux 2	必克強
				EC 30%	香蕉粉介壳虫 500倍 按25%比例增加希釋倍數		
安美加	3-Methyl-4-dimethylaminophenyl-N-monomethylcarbamate	50	WP	75%	大豆害虫(浮塵子、擬尺蠖、夜蛾及毒蛾幼虫) 1,500倍 1.0~1.3公斤/公頃 大豆害虫(椿象類、白綠蚜蟲及夜蛾幼虫) 1,500倍 1.3公斤/公頃 亞麻夜蛾類 750倍 1.3公斤/公頃	Matacil	滅虫死
					Aminocarb		

說明：(一)EC=乳劑。(二)WP=可濕性粉劑。(三)D=粉劑。
 四毒性指白鼠口服致死半量(LD₅₀)而言。例如某種動物100隻，每隻體重1公斤，若每隻攝取某種藥物5mg時即有50隻死亡，即此動物的半數致死量為LD₅₀=5mg/kg。為簡便起見，只記5數字。