圓蘭草加工有前途！

劉坤德

圓蘭草俗稱燈心草，主產於日本岡山及熊本等縣，近年才由民間引進栽培，今年全省栽培面積，約有六百餘公頃，遍及本省中北部十縣市六十四鄉鎮。

產量每公頃一萬～一萬二千公斤，經過乾燥後的圓蘭草，亦有三千～三千六百公斤。依目前收購價格，每公斤十四～十五元，如果栽培一公頃的圓蘭草，可收到四萬二千元～五萬四千元之多，是利潤相當高的一種新興農作物。

我曾專程訪問草屯鎮農會推廣股洪股長，並參觀在台灣省手工業研究所內舉行的圓蘭草機械乾燥，特作一個簡單介紹。

圓蘭草是屬於長日多照作物，對溫度的反應最爲敏銳，一般在二十三度C時，可以促進分蘗，後期二十四度～二十五度C會促進莖伸長。

生育期最忌氣溫突然升高，如氣溫升高至三十度C時，生長即行停止。溫和微風的氣候是圓蘭草生育的理想地帶。

圓蘭草宜種植在表土深厚，水源充足地方的填質壤土中。排水不良，沙質壤土或粘重土，會使草莖粗短、剛硬，或使草質柔弱易倒伏，均不適合圓蘭草栽培。

本省每年約在八月上旬開始育苗，是用無性繁殖法，利用根芽分株育苗的，到了第二期水稻收穫後，立即深耕碎土，使土壤充分風化，至十二月上旬，再混施基肥，精整耙平，灌水，等土壤稍堅後再行插植。

插植方法是將育成的苗，自苗圃掘起，分苗移栽於本田，與插植水稻方法相同。不過在多風地區，應將種苗梢部迎風略呈斜向插入，以免倒伏。

插植後三十天內，應經常保持水四～五公分，以後漸減灌水深度，至收穫前十餘日，要完全排水，使土壤乾燥，以便於收穫工作的進行。

圓蘭草對氮肥需要量最多，次爲



——圓蘭草栽培講習會（劉攝）——

原裝進口
人畜無害

愛多收
（アトニック）ATONIK

植物細胞賦活劑

布面撒葉
注灌
漬浸子種

養「仔豬」福音！（促進發育）

日本旭化學工業株式會社 出品
總代理：台實貿易股份有限公司
台北市太原路44號 TEL. 545437・541119

經市進第567號
商標註册證第11873號
64566號

※請認明商標・以防仿造※