鉀肥，磷肥較少。如果每分地用一千公斤堆肥作基肥，將可促進新根生長發育。在生育前期不宜施肥料，以免增加無效分蘗，影響後期的正常生長。後期可以多施氮鉀肥，有助草莖的伸長發育。

生 長期如有雜草，可施用「馬上除」殺草劑，用量是每分地用二．五公斤～三公斤，可以殺滅雜草。

圓蘭草收穫是在五～六月間，這時的草色由青綠轉呈青黃，具光澤富彈力。收割工作最好在晴朗的清晨進行，雨前雨後均不適當。

收割後去雜，再按不同的長度立即予以分級，然後染土，泥染後再乾燥。

所謂染土是將圓蘭草浸漬於特製的泥液中，使草莖表面均勻沾染一層極薄的泥漿。其目的有三：㈠保持圓蘭草的原有色澤及氣味。㈡使草莖得以均勻乾燥。㈢調節儲藏時的水分，以免草體變質。

但是所用泥土，絕不可含有氧化鐵、硫化物或有機質等物質。


染土以含有〇．〇二公厘以下的土粒愈小愈好，普通以呈青灰色的坋粒土品質較好。

空中水稻



員林百果山風景區，今年七月間，管理員無意中發現，距離地面約七公尺高的塑膠排水管口，長出一叢水稻。經過三個多月，居然株高六尺五寸，結穗豐滿，眞是祥瑞之兆。

這一叢水稻約四十餘穗，穗結實三百餘粒。由於生長位置懸空，只好用支架牢固。空中稻株，吸引了不少觀衆。（薛聰賢）

●強力●輕便
●省油●耐用
Robin
樂敏牌
ロビン
エンジン
農業、產業機械之動力源
二衝程・四衝程

EY18B
製造元 富士重工業株式會社
經銷處：樂敏有限公司
一馬力至二十馬力各馬力齊全
台北市康定路18號4樓 TEL. 360740·362045