



拔仔天牛防治

〔問〕：我所種的拔仔樹幹皮部有圍頭現象，對拔仔有何影響？防治法如何？（雲林縣薊桐鄉薊桐村中正路一九〇號廖振源）

〔答〕：侵蝕番石榴（拔仔）皮部的害虫是天牛的幼虫。天牛的雌成虫常在番石榴枝幹的皮部產卵，孵化成幼虫後，向皮部內部蝕塞，使枝幹枯死。

防治天牛產卵最好是用地特靈，但此藥現已禁止使用，可改用「速滅松」三〇〇~五〇〇倍。每月在枝幹噴一次，亦可收效。（張振宙）

米象防治

〔問〕：敝廠曾以特案融資方式，進口數千噸小麥，最近因氣候關係，倉庫中小麥受象鼻蟲為害。

敝廠曾用農藥「賽文」及「BHC」處理過，但效果不大，殺虫率非常低，應如何才好？（高雄市臨海二路一八號永光製粉股份有限公司）

〔答〕：為倉庫中米、小麥、大麥等谷類的「米象」，即一般所說的米谷象鼻虫。此虫使用「賽文」或「BHC」等藥劑並無效果。應該採用

燻蒸劑溴化甲烷 (Methyl Bromide)，才會有效。溴化甲烷是一種壓縮氣體，使用時必須有密閉倉庫或密室，大約燻蒸一天一夜就有效。此劑可向台南市東門路二三一號惠光化學股份有限公司洽購。使用技術亦可向惠光公司請求技術指導，也可向台灣省農業試驗所動物系請求協助。（張良傳）

番鴨蛋機器孵化

〔問〕：(一)番鴨蛋是否可用孵化器孵出小鴨？

〔答〕：(一)番鴨蛋可用孵化器孵化，但孵出百分率很低，因所需的溫度與孵雞蛋不同。在整個孵化期，前二十八天要經常保持溫度九九~一〇〇度F，濕度八七~八八%。後四~七天，溫度九七~九八度F，濕度九〇~九二%（番鴨的孵化期共三五天）。這全靠經驗，宜隨時注意調整溫度。


在孵化後期有時還需噴洒溫水或把孵化蛋浸在溫水中，再立即取出，以增加濕度。有時啄壳時也需適時幫忙破壳，否則會悶死而孵不出。

〔二〕母番鴨能適時調節溫度，孵過二十天後胚胎發育已健全，所以很容易孵出。而孵化器的濕度如控制不好，即易半途停止發育。（唐清奇）

適用全部作物！消滅全部害蟲！
世界專利的特效綜合殺蟲劑！

好年冬

(加保扶) 粒劑
用手撒佈，省工方便!!
現貨供應!! 說明書備索!!



正豐化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
台灣總代理：國際技術社股份有限公司

國語日報

女子愛國語 · 國語愛女子

為什麼家家歡迎國語日報？

國語日報是一份「小型的大報」，內容純正高尚，消息迅速正確，短評「日日談」立論公正，專欄跟副刊可讀性極高。國語日報全部用白話文撰稿，並且字字注上標準國音。常讀國語日報，可以學國語、學現代文字。國語日報每天有一「兒童」和「少年」一家庭一副刊，並有兒童習作園地「我的作品」和「小畫家」。一份報，大家看為國文課本。「書和人」是介紹書籍與人物的權威讀物。報價每月六十元。

國語日報出版部

設有舒適美觀的書屋，陳列本報出版的兒童讀物、家庭讀物、國語文書刊。每天營業到晚上八點，歡迎家長下班時帶子女來買書看書。

國語日報語文中心

設備雅潔舒適，教室氣溫調節，開有外籍人士和華僑華語班，國語正音班，中小學生作文班，成人、兒童書法班。採小班制，重視個別指導。

訂報電話：三四二四四八
出版部電話：三四三五一〇
語文中心電話：三四八八二一
● 臺北市福州街十號之三
● 臺北市福州街十一號之三
● 臺北市福州街11號之三
● 四樓

地鼠防治

〔問〕：在地下亂鑽的鑽鼠，使田地受損，而且損害作物的根部，應如何防治？（台南縣大內鄉石城村一〇五號楊燈輝）

〔答〕：來信所說的鑽鼠，一般叫地鼠，正名叫鼯鼠或地皮老鼠，是一種啮齒小動物的鼠類。

地鼠生活在土中，體長四、五寸，本身並不為害農作物，但在土中尋找小昆蟲及蚯蚓為食時，常將土壤鑽洞，使土壤鬆，使作物死亡。

地鼠雖然在土中鑽土，但也會到地面，尤其喜歡到田園四周的田埂邊，所以可用小魚乾或魷魚沾上殺鼠藥來誘殺，它吃到後，自然中毒死亡。（張良傳）

高等則農地建農舍

限自耕農本人申請

屏東縣萬丹鄉廣安村二十七號 劉昌盛先生問：

〔政府六十二年十二月廿四日公布「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」第三條規定「實施都市計畫以外地區，一至八等則田地，除土地所有權人，與建自用農舍外，一律不准建築。」

如土地所有權人現為公務員（農校畢業），其妻為自耕農，可否以土地所有權人名義，申請在一至八等則田地上興建農舍？

〔該辦法第四條：「申請興建自用農舍的起造人，應具有自耕農身分：」，其妻以自耕農身分，可否在乃夫所有一至八等則用地興建自用農舍？

〔第四條又規定：「其建築總樓地板面積不得超過二百平方公尺（約六十坪），建築面積不得超過耕地百分之五：」。所謂建築面積



積不得超過耕地面積百分之五，是申請建築那一筆土地面積的百分之五，或申請人所有耕地總面積的百分之五？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：〔所指土地所有權人是農校畢業，應認有自耕能力者。但是現任公務員而非自耕農身分，此與公布的管理辦法第四條，顯有抵觸，所以難以他的名義申請興建。〕

〔結婚時屬於夫妻的財產，及婚姻關係存續中夫妻所取得的財產，皆為夫妻共有財產。又，夫妻於日常家務，互為代理人，民

法第一〇一六條，一〇〇三條著有明文。所以土地所有權雖是夫的名義，因屬夫妻共有財產，其妻又具有自耕農身分，依管理辦法第四條，以妻為起造人申請興建，應無不可。

〔如申請人將附近所營各筆農地一併提出申請，則農舍建築面積應按全部總面積比例計算。

玉米種子儲藏

〔問〕：〔去年買的台南十一號玉米種子，在今年水稻收穫前播種，行糊仔栽培，是否可以？山坡地能否種植？

〔北、中、南部宜種的玉米品種是什麼？何處可買到種子？（彰化大村鄉福興村山脚路七〇號謝文桂）


〔答〕：〔玉米種子須在〇、五度C的冷藏庫保存，才能確保發芽率。如隨便放在室內溫度二五、三〇度C的環境下，雖然外表沒有谷象（蛀蟲）蛀食現象，但往往發芽率已降到五〇%以下。

有些發芽率仍可達七〇、八〇%依保存的情形而不同。如要水稻糊仔玉米，最好採用台南五號，因水稻收穫後氣溫降低，較不適合種台南十一號。

山坡地照樣能夠種植雜交玉米，只要把握適時播種，充分施肥及灌溉，即可生長良好。

〔目前本省栽培的玉米有台南五號（播種期：九月中旬至十月下旬），台南十一號（播種期：九月中旬至十月上旬）。

種子可到當地農會推廣股洽購，或寫信到「台中縣新社鄉大南村種苗繁殖場」購買。種子費，政府公定價格每公斤三〇元，一分地須種子量二、五公斤，共須七五元。（陳振耕）



楊桃繁殖

〔問〕：〔軟枝楊桃要用何種方法繁殖幼苗較適當？

〔目前推廣的楊桃品種是什麼？栽培期間應施幾次肥料？施什麼肥料？開花期間應施何種農藥？（花蓮縣壽豐鄉樹湖村一一六號劉福海）

〔答〕：〔楊桃必需用接木繁殖法，通常使用枝接（切接）法，如用靠接法則更可靠。砧木可用酸楊桃實生苗。

〔目前栽培品種大都為軟枝密桃或廣東種。

〔楊桃喜歡肥沃潤濕，所以栽培期間不妨盡量施入堆肥、厩肥等有機肥料，結果樹再酌施用台肥五號複合肥料。

盛花期最好勿亂噴藥，如發現虫害再噴馬拉松即可。普通楊桃很少發生病虫害。（李信芳）

牛糞養魚

〔問〕：〔牛糞是否可以用來養魚？

〔牛糞營養成分為何？和豬糞有何差別？（雲林縣麥寮鄉海豐村八十一號王川盛）

〔答〕：〔牛糞可作為養魚用的肥料。

〔牛糞與豬糞成分比較如下：牛糞含氮素〇・三%，磷酸〇・一七%，氧化鈣〇・一%。豬糞含氮素〇・五%，磷酸〇・四%，氧化鈣〇・五%。（鄧火土）