

• 洋葱主要病害防治 •

陳榮銘

洋蔥病害有十餘種之多，本省常發生的主要病害有露菌病、紫斑病、黑穗病、炭疽病、銹病、萎縮病等六種。

防治法：（1）無病苗圃採苗。（2）避免連作。（3）溫湯浸種：方法與露菌處理相同。

附着於寄主，至翌年傳染發病。洋蔥自被感染至發病約九~十天。

病徵：本病發生於葉及鱗莖上，初發發生水狀小斑點，漸次擴大爲一、三公分左右正圓形暗綠色黑色凹陷斑點。

浦可濕性粉劑（大生M三一）。(3)注意施肥，堆肥中加施石灰。(4)噴四~四式至三~三式波爾多液。

病徵：發生於葉及花梗上，初呈黃白色長橢圓形或紡錘形的斑點，後逐漸擴大為暗紫色帶狀病斑。表面覆有白色微狀物，此為分生孢子，若遇高溫則暗綠色。本病於湘南冬季節，溫度低（十五度C）時發生嚴重。

病徵：本病發生於葉及鱗莖上，初發生浸水狀小斑點，漸次擴大爲 $1\sim3$ 公分左右不正圓形暗綠色黑色凹陷斑點。
傳染途徑：由菌絲、孢子的子座附着於鱗莖寄生，而以孢子由空氣傳播，蔓延感染發病。

浦可濕性粉劑（大生M三一）。(3)注意施肥，堆肥中加施石灰。(4)噴四~四式至三~三式波爾多液。

越冬，以分生孢子作為感染原。防治法：（1）溫湯浸種，將種子浸清於五〇度C溫水二十五分鐘後取出，再浸於冷水中。（2）發病嚴重時，實施輪作。（3）拔除燒燬病葉。（4）發病初期起，每隔七至十天噴八〇%錳乃浦（大生二二）。

防治法：（1）栽培抗病性品种——有
色品种。（2）鳞茎收穫後充分乾燥。（3）
發病嚴重地，實施輪作。（4）鱗莖儲藏處
，應保持通風良好，溫度〇°C ~ 二度C。

淡黃白色條斑，後其葉黃化而漸失綠色，可
見至枯萎。
傳染途徑：係由媒介昆蟲——蚜蟲傳播。
毒素感染發病。
防治法：

- (1) 以五〇%馬拉松乳劑噴灑。
- (2) 拔除或徹底防除媒介昆蟲——蚜蟲。
- (3) 無病地採苗。

深埋或燒燬病株。

紫斑病

病徵：又叫黑斑病，常發生於葉及花梗上，初呈淡褐色橢圓形或紡錘形斑點，後逐漸擴大呈暗紫色凹陷，淡褐色而枯萎，表面有覆同心輪狀煤狀粉末，為分生孢子。
傳染途徑：以分生孢子或菌絲，由空氣傳播，附着於葉或花梗上感染發病。
防治法：(1) 發病初期起，每隔七天噴七五%鋅乃浦(大生七八)。(2) 定植十五天後，噴六六六式波爾多液。(3) 發生嚴重地區，實施輪作。(4) 拔除並燒燬病葉。

黑穗病

病徵：起初葉部呈鉛色條斑，後期破裂
可見暗褐色粉末狀厚膜孢子，葉萎縮，扭曲
如於生長初期患本病則不生鱗莖，當葉長
至二、三寸時則此病原菌不易侵入爲害。
傳染途徑：以殘留土中厚膜孢子，於洋
葱發芽時侵入爲害。

二公厘長的橢圓形或卵形，中央部呈橙黃色，微隆起，外圍有淡黃白色的窄圈。後期種子堆，縱裂飛散出黃赤色粉狀物，爲夏孢子，後病斑逐變爲褐色，表面覆蓋着冬孢子堆。

病徵 · 本病

發生於葉及花梗上，最初毒

徹底防除媒介昆蟲——蚜蟲。(2)拔除並深埋或燒燬病株。(3)無病地採苗。

果菜公司請農民當心
販運商造謠欺騙

販運商造謠欺騙

農民登記為供應人的手續非常簡單，只要準備照片二張，並攜帶身分證與私章，在每月十一日至二十日之間，到台北市水源路四〇一號果菜公司辦理，或以通信登記也可以。

春節休市二天
至西洽止異尋

个要送去果菜