

軟枝楊桃觀賞盆栽

郭瑞祥

一般人提起盆栽，總會馬上想到花卉盆景，因花盆上美麗爭妍的花朵是逗人喜愛的，並可調劑身心。但很少人會想到將原為體形龐大的果樹，從綠野移入室內，使室內的布置情調改變，點綴一下新的氣氛。例如綠葉的長青，果實顏色的自然變化，果實形狀的奇特等。


例如利用軟枝楊桃來做為觀賞果木的盆栽，不僅綠葉好看，所結果實自然分成五瓣，再配合預先做成的網狀棚架（小型棚架），待後枝條生長於架上，果實則垂吊於架下，即可形成一幅自然美的圖畫，其觀賞價值並不亞於一般花卉盆栽。

現在簡單說明一下軟枝楊桃盆栽的方法——

材料：軟枝楊桃，品種算是楊桃種類中最優良者，苗以本省永靖、田尾一帶最多。

過盆：視大小而定，通常苗六分大時用盆四分即可以求調和。下圖的盆徑為一二英寸素燒盆。

盆土：以新質壤土為佳，可保持水分、肥料不



易流失。

管理要點：軟枝楊桃和普通盆花一樣，只要日光充足，所結果實就會好看。還有果苗栽入盆內以後，大約發育半年即可在盆上搭棚架。可隨意更改做成各種不同的形狀，棚架與盆子須連接固定好，以防倒下。平日不能缺少水分，普通一天可澆水一次。病蟲害方面，只要注意預防即可。

朋友！為增加室內的布置情調，也來種植一盆吧！不僅可以欣賞，也可以吃。你只要花很短的時間，就可育成一盆奇特的軟枝楊桃盆景。



上：天山 下：瑞兒

培養土：觀音棕竹對土壤並不苛求，然為了培養優型植株，應使用含肥分少的河沙栽培，或混合些許腐質壤土。在日本也有使用細石或碎磚瓦塊種植者。

澆水及管理：每日澆水一次，夏季午間可用噴霧器噴濕葉面，冬天間日或三日澆水一次。每個月施用腐熟雞糞或油粕一次，最好少施用含氮量多的肥料，以免葉型變化。

病蟲害防除：觀音棕竹容易得到一種真菌性的病害，感染初期，肉眼難以發現，等到病菌死後，則出現茶褐色胡麻般斑點，逐漸擴大使葉片枯黃。

到目前還沒有可靠而澈底的防治方法，要注意環境的通風，光線的照射以及澆水的控制，並時常噴用大生粉等殺菌劑。

除外，介壳虫也容易發生。發生於根部時，老葉凋黃，植株顯得沒有生機，宜使用巴拉松或馬拉松等殺虫劑，希釋一千倍，灌注植株根部。發現於葉片或幹上時，使用以上藥劑噴施植株即可。

繁殖：實生播種法易使植株異化，在改良品種時使用。播種時把種子置放於較潮濕陰涼的地上，上面覆蓋些稻草或草席，以防水分蒸發過快，並時常澆水，約一至二個月即可發芽，小苗生長緩慢。

一般為了保存固有品種的特性，都以分株繁殖為主，將母株所生子芽連根切下種植，但絕不能切未發根的子芽，因其發根極為不易。

為了迅速恢復植株發育，切下後立即栽種，並在培養土上蓋一層水苔，更為理想。