

。種植時宜將老根及地上部葉片剪除，種後隨時澆水，以促進新根系的形成。

一般種植畦均東西向，畦苗南北成行種植，畦高出地面約十至三十公分，畦寬約一·二公尺的長條形，以利灌溉。

若超過一·六公尺，則施肥、收穫及管理均不方便。畦長可因地而異，並無嚴格限制。

## 防治病蟲

韭菜具強烈的辛辣味，一般病蟲害並不嚴重，歐美更有栽植於十字花科植物的四周，以為保護作物者。

韭菜常見的病害有灰黴病、露菌

病及赤銹病。

一般均在過濕、生長不良或太乾燥的情況下易發生。大都危害地上部，形成各種病斑，阻礙光合作用，甚或白化死亡。

防治要點為多施用有機肥料，並注重田間管理，以培育健壯的植株，發病時可噴錫乃浦或錳乃浦四〇〇倍液防治。蟲害則以菜潛蠅、薊馬、蚜虫及線虫為主。

紅蜘蛛過去曾一度猖獗，現已絕跡。除了線虫實施土壤消毒外，其他吸食汁液及葉內的害虫均可噴施八〇〇倍馬拉松乳劑或一、〇〇〇倍大粒農乳劑或福賜靈乳劑防治。

此外，避免同科植物連作，亦為有效的防治方法。收穫前三星期即應

停止噴藥，以確保食用安全。

## 韭黃價高

韭菜定植後經三、四次收割，其生長茂盛分蘖轉旺，此時可在田間打樁搭架，實施軟化栽培。


一般均以草蓆或草袋覆蓋數層，此種無光下生長的韭菜味淡而色白，即是一般所稱的韭黃或白韭菜，很受都市餐館的歡迎。如果勞力足夠，市郊栽培韭菜並從事韭黃生產，必有可觀的收入。

軟化栽培以兩次為限，若繼續三次而中間不加普通栽培管理，則韭菜生長勢弱，所得韭黃質劣量少，甚至摧殘原有母株，栽培者應加注意。

## 加強研究


韭菜原產於亞洲，台灣雖栽培很早，但以庭院栽種自家供給為原則，質量均未嚴格要求。

今後應就遺傳育種及栽培管理方面多下功夫，以培育出適合市場需要，產量高品質優的品種，同時要研究更合理的施肥管理方法，以期發揮韭菜的生產潛力。



蔬菜空批市場 (鮑國璋)

又方、  
**韭菜**



英國製  
電動式強力噴霧槍

用途：汽車、傢俱牆壁、花卉去污及噴灑殺蟲劑。

總代理：偉振企業有限公司

台北郵政36-407信箱  
電話：7213917·7310124

## 豐年叢書

農業知識寶庫

# 741 觀賞植物  
定價44元(含郵資)

# 742 台灣野生蘭  
定價124元(含郵資)

# 743 食用菇栽培技術  
定價74元(含郵資)

郵政畫撥

五九三〇豐年社