


## 注意飼養管理

(一)通常一日給食三次，但如時間允許，能喂四次更好。譬如：早晨八時吃濃厚飼料，中午十二時、下午四時、晚間八時分別供給草料，對於哺乳的母兔或肉用兔的生長，大有裨益。(註：供給太多的飼料，兔子會亂扒，如經踐踏或沾染糞尿，牠就不吃了，造成很大的浪費，少量多餐，把飼料全部吃光，又經濟又衛生。)

(二)母兔哺乳期間，濃厚飼料應予加重分量，以供給足量的蛋白質、礦物質與維生素。(參考配方：黃豆粉二〇%、魚粉一〇%、麸皮四〇%、玉米



籠兔見籠

粉二五%、牧草粉五%，酌加少許的食塩與歐羅肥。

(三)每周要固定一天供給乾草一次，如乾稻草、牧草或花生藤，以補給維他命D，且可防止下痢。

(四)如供給水分多的甘薯或蔬菜葉，恐怕兔子發生下痢，可在給食後一小時，酌量投給麸皮或晒乾的銀合歡，即可防患下痢。

## 避免驚擾損失

(一)家兔的習性輕浮胆小，容易受驚亂跑。兔舍裡如有一隻亂跑，全舍兔子也跟着亂跳亂跑，妊娠兔受驚易致流產。

母兔在哺乳時受驚，最易踏死仔兔，所以兔舍附近要保持寧靜，應防止貓狗無故侵入，陌生人要進入兔舍，也應特別小心，藉免無謂的驚擾損失。

(二)有生殖能力的母兔，其飼養時間以不超過二年為宜，超過二年者除非體力特別強壯的，應及早淘汰，以保持最旺盛的生產力。

因為母兔生產胎次越多，越顯得瘦弱老化，牠所撫養的仔兔也顯得發育遲緩。(有人認為母兔可飼養四年，似乎是太久了，實不合經濟原則。)

## 注意防治疾病

(一)家兔最普遍的疾病是球虫病，幼兔每個月、成兔每兩個月應防治一次，採用間歇治療法，治療三天，間歇二天，再治療三天，效果不錯。採用一般動物用球虫藥劑，先溶解於水中，再摻入濃厚飼料中給食，即可奏效。

(二)兔子最易患的外科疾病是疥癬與腳趾疥癬。積極的預防重於消極的治療。預防疥癬最簡易的作法：以一〇〇%的牛豬安溶於水中，然後噴霧內耳，洗滌腳部，每十天至十五天防治一次，就不致於發生討厭的疥癬。

兔籠內如能夠天天清除污積物最好，起碼每三天要徹底清理一次，以避免腳部踐踏髒物而引起腳癬。

## 兔年兔展

本社於春節期間，在台北市榮星花園舉行的兔子展覽，有來自全省各地的名貴品種七十餘隻展出。

這些兔子，是由下列養兔者提供的：

- ①台北縣養兔協會(三重市重新路三段七五號)。
  - ②萬隆種兔場(台北市木柵區和興路十五號)。
  - ③北斗鎮農會養兔場(彰化北斗鎮中寮路十一號)。
  - ④高水源先生(台北市民生東路九一七號之三)。
  - ⑤七股種兔養殖場(台南縣七股鄉大寮村八五號)。
  - ⑥信安農牧公司(台南縣佳里鎮海澄里四五之一號)。
  - ⑦豐碩養兔場(台南縣佳里鎮潭洲里二八一號楊木林)。
  - ⑧家和養兔園(高雄湖內鄉大湖村一二號)。
  - ⑨簡慶文先生(台中市康樂街六三號)。
  - ⑩佳佳養兔園(台北深坑坑鄉平埔一七五之一號)。
  - ⑪二崙島兔繁殖場(雲林縣二崙鄉田尾村四八號)。
  - ⑫洪敏卿先生(台北市中山北路三段一四七巷一九號)。
  - ⑬朱光候先生(宜蘭郵箱七五〇號)。
- 以上均由本社頒給獎狀，榮星花園贈送紀念品，以資鼓勵與紀念。

## 名貴品種