

消遙自在 (張榕攝)

，用來儲存食物，如不於傍晚加餵一次，則鵝隻將會因沒吃飽而無法維持，久之，即呈腳弱，腳立不穩而致無法走動。

養到三月齡，平均六台斤以上時，就可以大麥拌玉米肥育。鵝屬水禽，應經常注意給水，不可有斷水情形，青料的供給，至少為飼料的兩倍量。每天如能充分給粗料和青料，則迅速增重，於四月齡時體重可達七台斤以上，此時出售飼料效率最好，以後就差些。

大鵝應多餵青草，每天放牧於果園中除草，只要有足夠的青草供鵝採食，傍晚加餵一次飼料就可維持。

種鵝繁殖力要強

六月齡的鵝羣中選活力強，體型優良，體重在標準體重以上，健康良好，精神飽滿者留種。種公鵝體重比母鵝稍大，種鵝飼料需加銀五%魚粉、二五%黃色玉米、七%麩皮，才能提高產蛋數、受精率和孵化率。


母鵝年產四窩，每窩產十~十五枚，如加餵精料且不給抱窩，則產蛋數及窩數可增加。一隻母鵝平均可孵八~十二枚蛋，因體重大，孵化破損蛋多，如讓母鵝抱窩，每年必減少生產種蛋一、二窩，所以在繁殖季節，應格外注意精料的供給，以提高繁殖能力。

注意疾病防治

鵝的疾病很少，除按期實施家禽霍亂預防注射外，如能注意保持鵝舍的乾燥，並維持通風良好，夏天防暑，冬天防寒設施，就可把鵝羣飼養得很好。

如果發現鵝隻有異樣，需立即隔離，請獸醫診斷病因，對症下藥，很快就會痊癒的。此外，小鵝階段應注意防風害或被狗咬傷，幼鵝的育雛箱或地板應保持乾燥，並墊上柔軟乾燥的乾草或木渣，可防鵝的腳弱。尤其於冷天，鵝蹠有靜脈分布，對冷地板或冷墊物有極敏感的反應，如鵝舍內太潮濕，將影響鵝的健康。

夏天應有遮蔭設備，不然，鵝羣將因酷熱而中暑，必須注意，如能依照上述各點養鵝，相信養鵝工作定能順利經營成功。



塘虱魚 (白衛理)

最新出版：

魚類水產養殖

(豐年叢書#751)

內容：

鯉魚 • 塘虱魚 • 鯰 • 福壽魚 • 虱目魚 • 花跳 • 歐洲鰻 • 草蝦 • 蚌 • 牡蠣 • 文蛤 • 牛蛙 • 鱉 • 龍鬚菜 • 魚的食譜 • 插圖很多

定價84元 (含郵資)

郵政畫撥5930豐年社