

農業

信箱

鐵樹播種

〔問〕：(一)鐵樹種子成熟時，是什麼樣子？

(二)如何播種？

(三)種子如何儲藏？(新竹縣香山鄉中隘村五七號邱福興)

〔答〕：(一)鐵樹種子扁卵形，成熟時外種皮呈鮮紅橙色，內種皮呈淡褐色。有時鐵樹種子是內部不飽滿的空粒，這種空粒當然不會發芽。充實飽滿的種子和空粒，重量相差很多，可以用手秤量比較。

(二)播種不限時節，隨時可以下種，因種子外皮厚硬，可用堆沙來促進發芽，即種子混合三倍量的河沙，堆在大花盆中，適量澆水，約一個月後，再播種於苗床中。

(三)鐵樹種子可經風乾或日晒乾燥後，用布袋儲藏於乾燥陰涼處。(胡大維)

泡桐天牛防治

〔問〕：(一)泡桐樹上枝葉茂盛，一切正常，為何二公尺以下的地方皮爛、陷入，是什麼病害？如何治療？

(二)泡桐施肥，以那種肥料較優？

(三)泡桐有那幾種？(花蓮縣光復)

鄉大全村八鄰一〇九號吳振昌)

〔答〕：(一)泡桐樹幹上二公尺以下的地方，如有孔，並有虫糞排出，是天牛為害。

天牛幼虫咬食木質部，並向外穿孔。

防治法：(1)用鉛絲或銅絲通入孔內，將虫拖出刺殺。

(2)自虫孔注入二硫化炭或用藥棉沾氯化苦少許，先塞入虫孔內，再以粘土封閉孔口。

(三)泡桐施肥以氮二十、磷七、鉀七的比例配合，效果較為顯著。泡桐造林地，每年施肥一次，每年每公頃施肥量為尿素四五公斤，過磷酸鈣四四公斤，氯化鉀十四公斤。

(四)泡桐有下列三種：

(1)泡桐 (Paulownia fortunei Hemsl.)。

(2)台灣泡桐，又稱白桐 (P. Kawakamii Ito)。

(3)日本泡桐 (P. tomentosa Steud.)。(應之璘)

椰樹金龜防治


〔問〕：椰子樹受犀角金龜為害，樹體腐蝕，應如何防治？(花蓮瑞穗國中教師)

〔答〕：椰樹心材被犀角金龜幼虫為害引起的腐敗，可在犀角金龜產卵季節(每年四月至十月間)，每二個月，在椰子樹心材部(生長點心葉部)，撒施五〇%丹粒劑，每株二〇至四〇公克，即可毒殺成虫。(張良傳)

日立



●強力●輕便
●省油●耐用




EY18B

一馬力至二十馬力各馬力齊全

農業、產業機械之動力源

二衝程・四衝程

製造元  富士重工業株式會社

經銷處：**樂敏有限公司**

台北市康定路18號4樓 TEL.3610740・3612045