



西印度櫻桃

西印度櫻桃果色富變化

●●●●● 郭瑞祥

西印度櫻桃的學名是 *Malpighia glabra L.*，屬於金虎尾科。原產於中南美洲，是常綠灌木。做為盆栽時，可以縮小它的樹形。因果實顏色富於自然的變化，由小果的青綠色到淡藍色、紫色，其間的一切變化過程蔚為奇觀，配合整形的樹枝綠葉，可成一盆具有觀賞價值的果木盆景。

西印度櫻桃苗木繁殖，以扦插法最理想。生根容易，成活率高，操作簡便，只要有良好的育苗場所，扦插後約一、二個月即可生根發芽。

經過育苗階段，當苗高二五、三〇公分便可做盆栽的材料。一般幼苗可向種苗行購買，便可省去育苗過程，且全年均可栽植。

西印度櫻桃生根力強，發育旺盛，栽植後滿一年以上時，可行鬚根的修剪。只要稍微剪去一些鬚根，切勿傷到主根，否則葉子馬上變黃而凋落。

盆栽時的水分蒸發率較強，尤其夏天須每日澆水，否則葉子（嫩葉較甚）會馬上顯出萎縮現象，須力求適中。

在整形修剪時，須特別注意，因為西印度櫻桃的傷口不易癒合，盡量避免較大枝的修剪。

普通在嫩芽長出後，約五、七天左右即可行修剪。修剪後，不久就長出兩個側芽，兩個側芽再一剪，又可長出四個芽。只要經過幾次的小心修剪，櫻桃的結果與顏色蛻變，可一一呈現在吾人的眼前。

一般杯狀形的整枝生長不大旺盛，自然形生長力較強。不同的形狀雖然生長發育力有別，但是不妨試試看，可以利用特殊的環境來彌補它的缺點，以達到盆栽的目的。

西印度櫻桃為熱帶果樹，台灣北部地區如欲行盆栽，對於低溫時期的防寒工作，不能掉以輕心。何況果木行盆栽的結果，能力已比不上園地栽培者，對於這一點要注意，以免影響了它的結果。

西印度櫻桃所含維他命C量極為豐富，據分析比柑桔多五〇、八〇倍，每人只要每日吃一、二粒，即夠體內維他命C的需要。

加上球形的果實，樹枝綠葉的襯托極為美麗，不妨試種一下，可觀賞又可食用，真是一舉兩得。

鮮艷多刺的麒麟花

—— 莖園

麒麟花是大戟科 (*Euphorbiaceae*) 的常綠灌木。學名: *Euphorbia Splendens*, Bojer.、英文名: *Crown of Thorns*, Bojer's Spurge、原產馬拉加西。

植株高一、二公尺，全株含有白漿，枝幹粗肥橫生，呈半蔓性。嫩枝綠色，老幹紫褐色，上面均密生棘刺，堅硬而銳利，具有自衛功能。

嫩枝的頂端生有少數綠色葉片，革質，倒卵圓形或長橢圓形，長三公分左右。花是聚繖花序，上有長花軸，生於枝梢的葉腋。通常供觀賞部分是色彩艷麗紅色對生、卵圓形的兩枚苞片。

麒麟花全年都能開花，但盛開季節是在冬季。

春、秋季用波插法繁殖，為操作方便，先將銳刺剪去，然後剪成十公分左右的插穗，等兩端切口上的白漿稍為乾燥凝結後，再插入肥沃的沙土內。

盆栽所用的培養土以園土四〇%，腐熟厩肥二〇%，落葉二〇%，粗沙二〇%。



麒麟花