



水稻施肥

〔問〕：水稻的基肥或全層施肥，應如何施用？

〔彰化縣二林鎮外竹里中南二四號林金昌〕

〔答〕：基肥通常於整地時，橫把後，混合均勻散施田面，然後即時直耙，蓋平田面，隨即插秧。

基肥施用量通常以一期作總施肥量的氮肥二五%，磷肥全量，及鉀肥五〇%施用，其餘肥料做追肥，分幾次使用。

全層施肥，是全期作總施肥量，於整地橫把後，全量一次散布於田面，然後直耙並蓋平田面後插秧。插秧後稻田不再追肥。

全層施肥方法，已經是老方法，肥效差，不宜再採用。（林寶鑫）

馬鈴薯留種

〔問〕：我所種馬鈴薯，現在已收完了，我自己想要留一些種薯，以便下次種，要如何留種？

〔雲林縣水林鄉頭厝寮三六號蔡仁富〕

〔答〕：馬鈴薯留種，必需注意由種薯傳染的病害。由種薯傳染的毒素病，在一般田間發現的有捲葉病（

拔仔葉）、連葉毒素病（嫩葉病）與丫毒素病。

要留種的時候，最好使用沒有毒素病、瘡痂病（貓仔皮）、黑痣病等的種薯。

在生長初期，實施田間檢查，把病株拔除，並用美達松等劑防治蚜虫，因為蚜虫會傳染毒素病。

在生長中、後期，都要檢查田間，拔去病株。

瘡痂病要採收以後才知道。凡有瘡痂病、粉瘡痂病的薯塊，絕對不可以作種用，否則將來會使薯塊失去商品價值。

如果需要種薯，可向鄉鎮農會申請登記梅峯種種薯。

一般農民有留小薯作種的習慣，這是最不理想的方式，因為病株的薯塊都小，留小薯作種，等於多發生病害，減少收量。（陳培昌）

泡桐招風

〔問〕：（一）颱風季節，泡桐樹葉是否要先砍除？砍除後會影響泡桐發育嗎？

〔答〕：（一）種植兩年的泡桐，可否挖根？挖根後是否會影響發育？

〔彰化縣員林鎮中山路五三號劉訓忠〕

〔答〕：（一）泡桐樹葉很大，光合作用旺盛，所以林木生長快速，如砍除樹葉，影響發育甚大。

萬一颱風吹襲，葉會自然先掉落，不必事前人為除葉。


（二）定植後的泡桐林木，如挖根，當然會影響發育，最好不要挖根。（林文鎮）



九福牌迴轉犁

ROTATILLER

根據台灣農民希望設計 九福牌迴轉犁可減輕使用馬力增加碎土細度不易纏草震動小等特性配用任何廠牌大中型曳引機迴轉犁。



九福牌迴轉犁50·60·70·80·90吋九福牌曳引機用玉米播種施肥機、花生播種機、大型噴霧機、拖車3.5噸 5噸配各廠牌曳引機用迴轉犁

備有60·77·85各型馬力曳引機 歡迎選購

零件供應充足！

歡迎各地經銷！

九福股份有限公司 出品

總公司地址：台中市復興路二段71巷5號

服務電話：(〇四二)51661

電報掛號：1269

都市計畫內耕地 租約得依法終止

台中市西區利民里康樂街二巷十一號陳正申先生問：

都市計畫範圍內住宅區(現地日仍為田)的三七五出租耕地，如欲出售作為建築使用時，出租人可否依照實施都市平均地權條例第五六條規定，終止耕地租約，而與第三人訂立買賣契約，或需依照耕地三七五減租條例第十五條，承租人有優先承買權的規定，書面通知承租人，否則與第三人所訂立契約不得對抗承租人。如屬前者，其終止租約手續如何？

本社轉請高瑞鈺律師答覆：

都市計畫範圍內的出租耕地，除都市計畫編為農業區綠帶者外，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用時，得終止租約。

實施都市平均地權條例第五六條，著有明文，此項耕地租約的終止，不受耕地三七五減租條例第十七條、十九條規定的限制，無論原訂租約已否期滿，均得終止(最高法院六十年台上字第一三三〇號判決)。

因此，出租人一經依法為終止之意思表示，此項耕地租賃關係即告消滅，承租人既因而喪失承租人的身分，自無再依耕地三七五減租

條例第十五條，由他優先承買的餘地。

換句話說，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用，即得終止租約，收回耕地。至於與第三人訂立買賣契約，為租賃關係消滅以後的事，顯然無須書面通知原承租人優先承買。

當然，耕地租約尚未依法終止，即行出賣時，承租人自有優先承買權。

關於終止租約的方法，得以郵局存証信函或經法院公證處認証的催告函，對承租人表示，依實施都市平均地權條例第五六條終止此項耕地租約，願按同條所訂標準給付補償，希其交還土地等語即可。



台中縣東勢鎮下城里三八九號陳慎城先生問：

祖傳田地一筆，原由各房輪值耕種祭祀，因產收不佳，一輪後他人均推辭不就，家父勉予承坦至今，請問何時可代辦耕地租佃？手續如何？

本社轉請高瑞鈺律師答覆：所指土地，既屬共有，應由共有人全體或其代理人，協同承租人前往鄉鎮公所填具租約正本二份、登記申請書一份，辦理三七五租約登記，手續甚為簡便。

兔脚癬病

〔問〕：我現在飼養的日本白兔，患了脚癬病，一直治不好，請問該如何防治？(嘉義縣義竹鄉北華村一八號蔡鯨良)

〔答〕：你所說的兔脚爪疥癬，即一般所說的香港脚。此病發生初期，在爪接着處的足趾部，初呈紅腫，而趾間的毛略向上展開，足趾內外露易見。

嚴重時，足趾間發生硬的痂皮，甚至所有足趾都被痂皮包在一起，成為一硬塊趾甲脫落。前肢常常上下打動，兔體日漸消瘦，可漫延至耳、耳等部。

發現此病時，應即時隔離治療，否則易傳染其他健康兔，而使所有兔隻全部感染。治療時可用牛猪安二〇〇倍洗滌患部，或用亞鉛華軟膏一磅、硫磺粉三分之一、二分之一磅、樟腦油二〇〇CC，混合成泥漿狀，依患部的足趾反方向塗抹，每隔一天一次，數次即可痊癒。

塗抹藥膏時，請將足趾的毛剪除，用溫水或及氧水洗淨，除去痂皮後才治療，效果較快。

此病最好能於平時使用牛猪安五〇〇倍液，每月浸兔的足趾一次，可避免發生脚癬病。(黃明道)

高麗參栽培

〔問〕：(一)本省何時種高麗參較好？(二)高麗參要如何種植才可使根長得好？(三)高麗參種子宜用幾年生？(四)高麗參葉子做菜吃，是否可以

？有何效用？(一)採去葉子後，是否會影響根的生長？(二)高麗參要如何加工？(三)台灣生產的高麗參，一錢賣多少？(四)本省生產的高麗參何處收購？(花蓮豐濱村二九鄰豐富一三七號王杏春)

〔答〕：(一)十月中旬至十一月種植高麗參較好。

(二)移植苗宜選長十五公分以上，一支重〇·八公克以上，直立伸長的較好，要除去支根，只留主根種植。

(三)採收第四年生已開花結果的高麗參成熟種子較好。

(四)參葉據說有去暑、降虛火、解酒毒、浸汁沐髮，能使頭髮不落的功效。

(五)採葉一般在夏季葉綠而肥時採收除乾。採葉太多，會影響根生長。

(六)高麗參加工種類有紅參及白參二種。白參高根洗刷乾淨，並用竹板刮去表皮。注意勿損傷內皮，然後在陽光下晒半天，使參體變軟，再用人工捆扎成成人體型，再晒，晒乾後去線繩，再晒一次。並經常翻動。晒七天即可。

紅參加工是將選好的參，刷淨主根與根鬚上的泥土。後蒸參，其法為將洗淨的參分成大、中、小三種，裝在麻裡用白皮包裝，後將麻放到鍋上加溫水，先用急火，見蒸氣頂到鍋上後火漸緩，蒸參時間一般三小時，屢下鍋後，停十分鐘再打開乾燥即可。

(七)普通一錢約五十元。

(八)台北市迪化街一帶中藥批發商行有收購。(楊永裕)