長壽花栽培容易・長期花

彭昌祜

長壽花是近年來本省的新花，但在美國，至少已栽培了四十年了。每年自感恩節十一月至次年五月，都是長壽花的花期，所以這個期間的各種節日，如聖誕節、新年、復活節都可用長壽花來裝飾。

長壽花是景天科的植物，英名Kalanchoe，學名Kalanchoe blossfeldiana，中Robert Blossfeld一位德國的育種家輸進美國。目前栽培種有矮性種，高二十公分，開紅色的小花，宜作盆花。

另有高性種，高達四十五公分，花形較大，花莖較長，可以作瓶花。據記載尚有黃花種，但目前本省尚未見到。

長壽花生長強健，栽培容易，開花容易，算是一種大衆的花卉。其姿態整齊，花色鮮艷，花期長，利用方便，不失爲一種值得推廣的花卉。

長壽花可以葉插、莖插、頂梢插等方法繁殖，插在清潔的沙中，等生根後再移入小盆栽植。

長壽花也可以用種子繁殖，數量多，生長快。但種子細小，播種必須小心，在攝氏二〇度～二五度，一〇～一四日發芽。幼苗容易受傷，要避免自上方洒水，由盆底浸水較佳。等幼苗稍大，可以移到小盆中種植。

美國也習慣在六英寸盆中種入三株，開花時花較多，色較濃，觀賞價值更高。播種時期若分爲幾次，則開花期早晚不一，更可延長觀賞期。

所用的土壤要輕鬆肥沃，排水尤須良好完全，否則根部便會爛掉，生長不良。壤土、沙、堆肥各一分混合成的盆土，略帶酸性，即可使長壽花生長良好。生長期間每三周或四周施肥一次，即可適合其生長需要。

台灣全年氣溫都適宜長壽花的生長，但若低於攝氏十度以下，生長便會變緩。放在陽光充足地點，花莖不致生長過長，但光線較弱時，葉色較好，以輪流在陽光下及半蔭地放置，可使葉花均佳。

長壽花是在短日照的冬季開花，若想使它在長日照的季節開花，在每日下午五時至次晨七時之間，用黑布遮住花苗不使見光，則能提早開花。

本省處於亞熱帶區域，日照較溫帶地區短，開花當更容易。

栽培長壽花有兩項障碍，一是莖腐病，是土壤中的病菌造成的，美國用土壤消毒及花盆消毒的方法來預防，此外注意排水，不使根部積水，也可以減輕病害。

二是虫害，蚜虫、粉虱都爲害花穗、葉片，必須趁早用烟草水、馬拉松等藥劑噴洒殺滅，否則全株美觀大受影响，也不能出售，對商業栽培者是大損失。

長壽花

山茶花：扦插嫁接繁殖

陳文孝

山茶花樹形及花型都很美，栽植在庭園中可周年欣賞，也可作營利栽培。因品種的不同分枝因而相異，一般以自然整枝爲原則。

通常以扦插或嫁接繁殖較多，扦插繁殖法可一時獲得多量苗木，但生長遲緩。一般採用扦插繁殖法，是自外國引入新品種或欲一時繁殖多量苗木時採用。

通常是在八～九月採用沙床實施插木，到第二年十月左右掘取施行假植。三月下旬到四月上旬移植到栽培床，以九〇公分的寬度，五～七株行條植，經二～三年的培養後即可做爲種木。

嫁接繁殖法通常在二月中旬到三月下旬實施，接木之後，以六五～七五公分的寬，株間三〇公分的距離實施育苗，一般經過三年後可使用爲種木，定植時先端生長太旺盛枝條，應行修剪。

山茶花遇低溫時，根部伸長困難，因此移植宜在高溫時行之。尤其在梅雨季節，新芽漸硬時期行移植最好。

通常山茶花不實施剪定，一般只在八～九月間採取插穗，或在春天接木時採取接穗而已。

山茶花