

農業信箱



塘虱魚人工授精

〔問〕：(一)鯉魚俗稱鱧魚嗎？
(二)人工授精時體重一台斤的塘虱魚，哥娜荷爾蒙及林格爾試液的使用量各多少？

〔答〕：(一)所謂肌肉注射是在魚腹部的什麼地方注射？深度多少？
(二)雌雄各一台斤體重的塘虱魚，行人工繁殖時，是否每尾雌魚所產的卵，一定要用一尾雄魚精巢來行交配？如用1雄配2雌，孵化率是否會不好？

〔問〕：(一)雌雄各一台斤體重的塘虱魚，行人工繁殖時，是否每尾雌魚所產的卵，一定要用一尾雄魚精巢來行交配？如用1雄配2雌，孵化率是否會不好？

〔答〕：(一)鯉魚、鱧魚是兩種不同的魚。
(二)塘虱魚注射哥娜荷爾蒙及林格爾試液量，一般為三、四台兩的母塘虱魚，每尾每次注射一八〇國際單位(IU)的哥娜荷爾蒙。隔六、八小時注射第二次。

林格爾試液以每尾每次〇·二五

CC計算，混入哥娜荷爾蒙內。
(三)肌肉注射是注射在背部與腹部之間，以不刺到內臟為原則。
(四)精巢部位在靠近背部腹腔兩側，色微粉紅，狹長鋸齒狀。

(五)一尾雄塘虱魚的精巢可配一、二尾母塘虱魚所擠的卵。
鯉魚目前市價不比塘虱魚高，目前多作食用。鯉魚在竹北水產試驗分所有飼養，及人工繁殖魚苗。
(六)塘虱魚發生皮爛現象，可能是水質不良所致，可部分更換池水外，以「泰滅淨」混合飼料給飼。(彭弘光)

〔問〕：我買了四組種兔，四天之內就死了三隻。死的情形是鼻子濕濕的，而且口還吐白沫，同時肚子鼓脹，請問死因和預防方法？是否因給兔子吃的青草和紅蘿蔔有毒引起的？(台中市西屯路一段三九二巷八號王茂源)

〔答〕：仔兔死亡的原因，關鍵並不在青飼料有無帶毒。
依來信所提仔兔死亡情形，實為因消化不良而引起的鼓腸症。
剛離乳不久的仔兔，因原來大部分依賴母兔供乳，而離乳後全部改變為青飼料或精飼料，以維持所需營養，消化機能改變很大。
如氣候不適宜或餵給不易消化的食物或供量過多，很容易引起死亡。
飼養時應選易於消化的飼料，且要定量定時。紅蘿蔔不能供應過量，否則易引起鼓腸症。(黃明道)

〔問〕：我買了四組種兔，四天之內就死了三隻。死的情形是鼻子濕濕的，而且口還吐白沫，同時肚子鼓脹，請問死因和預防方法？是否因給兔子吃的青草和紅蘿蔔有毒引起的？(台中市西屯路一段三九二巷八號王茂源)

〔答〕：仔兔死亡的原因，關鍵並不在青飼料有無帶毒。
依來信所提仔兔死亡情形，實為因消化不良而引起的鼓腸症。
剛離乳不久的仔兔，因原來大部分依賴母兔供乳，而離乳後全部改變為青飼料或精飼料，以維持所需營養，消化機能改變很大。
如氣候不適宜或餵給不易消化的食物或供量過多，很容易引起死亡。
飼養時應選易於消化的飼料，且要定量定時。紅蘿蔔不能供應過量，否則易引起鼓腸症。(黃明道)

〔問〕：我買了四組種兔，四天之內就死了三隻。死的情形是鼻子濕濕的，而且口還吐白沫，同時肚子鼓脹，請問死因和預防方法？是否因給兔子吃的青草和紅蘿蔔有毒引起的？(台中市西屯路一段三九二巷八號王茂源)

〔問〕：我買了四組種兔，四天之內就死了三隻。死的情形是鼻子濕濕的，而且口還吐白沫，同時肚子鼓脹，請問死因和預防方法？是否因給兔子吃的青草和紅蘿蔔有毒引起的？(台中市西屯路一段三九二巷八號王茂源)

〔答〕：仔兔死亡的原因，關鍵並不在青飼料有無帶毒。
依來信所提仔兔死亡情形，實為因消化不良而引起的鼓腸症。
剛離乳不久的仔兔，因原來大部分依賴母兔供乳，而離乳後全部改變為青飼料或精飼料，以維持所需營養，消化機能改變很大。
如氣候不適宜或餵給不易消化的食物或供量過多，很容易引起死亡。
飼養時應選易於消化的飼料，且要定量定時。紅蘿蔔不能供應過量，否則易引起鼓腸症。(黃明道)

農友們期待已久

強力白粉克乳劑 37.4%

已再進口了！

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、蔬菜等一般果樹白粉病剋星、敬請愛用本劑

現貨供應：新包裝100c.c.×60支紙盒裝

黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓
電話：(02)3816895

草莓優良品種

〔問〕：(一)目前推廣的草莓品種是什麼？生長環境宜如何？(二)種苗何處買？(三)何處收購？

〔答〕：(一)目前推廣的草莓品種為 Aliso。草莓的生育適溫為攝氏十八至二十二度。排水良好的沙質壤土甚二十號李金華

〔南投縣草市鎮的山坡地是否適宜種植？(南投縣草屯鎮北勢里玉屏巷二十號李金華)

〔答〕：(一)目前推廣的草莓品種為 Aliso。草莓的生育適溫為攝氏十八至二十二度。排水良好的沙質壤土甚二十號李金華

河床土地再浮出 原主回復所有權

〔問〕：(一)目前推廣的草莓品種是什麼？生長環境宜如何？(二)種苗何處買？(三)何處收購？

〔答〕：(一)目前推廣的草莓品種為 Aliso。草莓的生育適溫為攝氏十八至二十二度。排水良好的沙質壤土甚二十號李金華



法律問題解答

，壤土或粘質壤土均適合栽培草莓。土壤反應以 pH 5.0~5.5 的微酸性土壤最宜。
① Aliso 種苗可向苗栗縣大湖鄉明湖村中原路一巷十四號吳呂裕農友洽購。
② 如栽培成功，有較大面積時，新竹農業改良場可推介食品工廠前往收購。
③ 山坡地如有灌溉設施亦可栽培草莓，但以平地的田區而有良好灌溉的土地為宜。(鄭希焜)

辦恢復所有權的登記。

〔南投縣安定鄉中沙村廿九之一號石東明先生問：

報載政府為顧及甚多祖傳土地，數代未曾辦理繼承登記，規定不必親屬全體的印鑑即能辦理，不知是否已實施，或有其他簡便辦法？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：繼承登記，由權利人聲請，土地登記規則第十八條著有明文。繼承人有多人時，自應由全體加蓋印鑑共同聲請，政府因不少私有土地數代未辦繼承，影響土地使用的困難，目前猶未定案。

繼承登記，如因繼承人意見紛歧或散布各方，難於共同申請，可訴請法院判決。勝訴判決後由原告聲請代為完成登記。

所指土地如不包括在出租範圍內，原地主自得任意耕作。不過，當初土地流失時，如曾辦理滅失登記，應即檢同證明文件向地政機關

木瓜雌雄鑑別

〔問〕：(一)矮種木瓜種子何處可買到？(二)木瓜有公有母，在幼苗時如何認出母樹？(三)如何避免栽到公株？(雲林縣斗六鎮北里中興路一三二巷一九號何金川)

〔答〕：(一)木瓜種子可向鳳山熱帶園藝試驗所洽購。木瓜栽培手冊可直接向此試驗所索取。

(二)木瓜幼苗雌雄性的鑑別，至今尚無正確可靠的科學方法。木瓜果實內種子的部位、大小、重量及莖高、葉形變化等均與木瓜性別的發生無關，不能用來判別性別。必須等到着蕾才能判定。

(三)為避免栽到雄(公)株，必須採用人工套袋，控制授粉方法，可完全控制種子的性別，使後代完全無雌株出現。(王德男)

狼尾草青儲

〔問〕：(一)狼尾草青儲的方法如何？(二)牛喜吃嗎？(三)可保存多少天？(四)有何參考書？(宜蘭縣立蘇澳國中周問先)

〔答〕：(一)狼尾草調製青儲草時，一般需有青儲容器。

青儲容器很多，如青儲窖、青儲塔、青儲槽、青儲壕等。

如沒有青儲容器，可用有相當韌性的塑膠布當容器，如此才不會被狼尾草刺破。

製作青儲草的一般操作程序如下

(1)準備充分的狼尾草，盡量一次裝滿青儲容器，避免多次分裝。
(2)將預備青儲的狼尾草切成約一寸長的短條。
(3)裝填時雖可與糖蜜等拌合，但非絕對必要，亦無須預乾。可將切短的狼尾草直接裝入青儲容器即可，但需注意盡量踏緊，趕出空氣。

(4)裝填完畢後，上面盡速用塑膠布覆蓋，使與外界空氣隔絕。
(5)塑膠布上再覆蓋一層約半尺厚的半乾碎土。如在室外製作青儲草，須再覆蓋一張塑膠布，以防雨水淋溼。

(6)牛通常喜歡吃狼尾草做的青儲草。

(一)一般可保存數年，牧草還不致變壞。

一般牧場的經濟經營，只將春夏生產過剩的牧草保存，準備冬季缺草時飼養家畜用。無需儲存過多，否則反不經濟。

製作青儲草的參考資料有：農復會及農林廳聯合出版的「牧野改良概說」。(林培旺)

〔問〕：(一)鼠，傷害農作物，怎麼消滅它？(屏東縣萬丹鄉社皮村十二號黃順益)

〔答〕：(一)鼠也叫做地鼠或愛鼠，均在土中穿行，尋食土中蚯蚓昆蟲等，使作物根部受害，或幼苗枯死。

防除方法可用小魚乾或魷魚烘香，粘上殺鼠藥，如弗拉多(フラトール)等，在黃昏時，散在地鼠出沒的地面上，使取食而中毒死亡。(張良傳)

聞鼠防治

〔問〕：(一)鼠，傷害農作物，怎麼消滅它？(屏東縣萬丹鄉社皮村十二號黃順益)

〔答〕：(一)鼠也叫做地鼠或愛鼠，均在土中穿行，尋食土中蚯蚓昆蟲等，使作物根部受害，或幼苗枯死。

防除方法可用小魚乾或魷魚烘香，粘上殺鼠藥，如弗拉多(フラトール)等，在黃昏時，散在地鼠出沒的地面上，使取食而中毒死亡。(張良傳)