

農業信箱



CC 計算，混入哥娜荷爾蒙
內。

(2) 肌肉注射是注射在背部與腹部之間，以不刺到內臟為原則。

(3) 精巢部位在靠近背部腹腔兩側，色微粉紅，狹長鋸齒狀。

(4) 一尾雄塘虱魚的精巢可配一~二尾母塘虱魚所擠的卵。

(5) 鮎魚目前市價不比塘虱魚高，目前多作食用。鮎魚在竹北水產試驗分

所有飼養，及人工繁殖魚苗。
(6) 塘虱魚發生皮爛現象，可能是水質不良所致，可部分更換池水外，以「泰滅淨」混合飼料給飼。(彭弘光)

兔鼓腸症

〔問〕：(1) 鯉魚俗稱鰱魚嗎？

(2) 人工授精時體重一台斤的塘虱魚，哥娜荷爾蒙及林格爾試液的使用量各多少？

(3) 所謂肌肉注射是在魚腹部的什麼地方？深度多少？

(4) 雄塘虱魚的精巢，在腹部的什

麼地方？何種形狀？什麼顏色？

(5) 雌雄各一台斤體重的塘虱魚，

行人工繁殖時，是否每尾雌魚所產的卵，一定要用一尾雄魚精巢來行交配？如用1雄配2雌，孵化率是否會不好？

(6) 塘虱魚發生皮爛現象，而後導致死亡，這是何病，要用何藥防治？

(台中清水鎮裕嘉里高美路三六六號洪衍竹)

〔答〕：(1) 鯉魚、鰱魚是兩種不同的魚。

(2) 塘虱魚注射哥娜荷爾蒙及林格

爾試液量，一般為三~四台兩的母塘虱魚，每尾每次注射一八〇國際單位(IU)的哥娜荷爾蒙。隔六~八小時注射第二次。

林格爾試液以每尾每次〇·二五

農友們期待已久

強力白粉克乳劑 37.4%

已再進口了！



現貨供應：新包裝 100c.c. × 60支紙盒裝

黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓

電話：(02) 3816895

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、蔬菜等一般果樹白粉病剋星、敬請愛用本劑

如氣候不適宜或餵給不易消化的食物或供量過多，很容易引起死亡。

飼養時應選易於消化的飼料，且要定量定時。紅蘿蔔不能供應過量，否則易引起鼓腸症。(黃明道)

剛離乳不久的仔兔，因原來大部分依賴母兔供乳，而離乳後全部改變為青飼料或精飼料，以維持所需營養

，消化機能改變很大。如氣候不適宜或餵給不易消化的食物或供量過多，很容易引起死亡。

飼養時應選易於消化的飼料，且要定量定時。紅蘿蔔不能供應過量，否則易引起鼓腸症。(黃明道)