



# 適宜室內裝飾的開花植物

李百華

工商愈進步，人們的精神生活愈感貧乏，爲了彌補此項缺憾，室內裝璜、家庭布置，似乎已是很時髦的話題。儘管現下富麗堂皇的房子到處可見，但是看了之後，總令人若有所失之感，也就是說漂亮儘管漂亮，然而却不能使人產生真正的美感，由高級木製或鐵板家具所填塞出來的空間，真是匠氣十足。

究其原因主要是沒有紅花綠葉的調和，記得誰曾說過：「即使沙羅門，裝飾得最華麗的時候也抵不上花的美麗。」因爲花的芳姿、瑰麗與馥郁芬芳，能使我們感到心曠神怡，看了之後美感油然而生，而更甚者，即是「生氣盎然」的氣氛。

所以若要講求生活藝術，家庭中鮮花盆景的點綴是不可或缺的。現在介紹幾種常用於室內裝飾的開花植物，及其管理上應注意事項——

**秋海棠類：**以盆栽的秋海棠裝飾窗台，或栽成懸掛式的花籃都很宜人。

室內溫度宜溫暖或稍涼爽，白天在華氏六〇至七〇度之間，晚間五十五度爲佳。

● 秋冬季節應給予全日照，春夏季則半日照或透過的陽光即可。植物生長期間土壤要保持均勻的濕度，室內濕度達五〇%爲宜。

**秋海棠**爲多年生草本植物，秋季開花，花色有紅色、粉紅色甚至白色。

通常盛行盆栽，也可應用於花壇種植。可於二至三月播

種，或在三至四月扦插球根上發出之芽。觀葉類秋海棠多行葉插法繁殖。

**風信子、鬱金香、水仙、番紅花：**風信子又名洋水仙，是多年生球根花卉，花期春季，花色爲藍紫或白色，但變化很多。

可於九至十月播種在育苗箱，或以分球法繁殖。適於排水良好，表土深厚而鬆軟的粘質壤土栽培，台灣適於海拔二千公尺處，九月種植。

**鬱金香**爲耐寒性球根花卉，種類繁多，由高僅數英寸，早在二月開花的品種，到大的雜交種於四至五月大量開花。一般用分球法繁殖，大部

分鬱金香喜歡太陽，十月中旬或十一月前不宜種植，如此葉子才不致於在冬天露出。

**水仙**是多年生球根花卉，是耐寒性春天植物。一般用自然分球法繁殖，最好在八月或九月種植，早秋即開始發根，春天生長期間要使根部能獲得充足的水分。

大球定植後，翌年掘起時通常有二、三子球，充分發育的子球容易分離，此子球栽培一年即可開花。土壤選粘質壤土最佳。

**水仙**性喜低溫，華氏四五至六〇度最適於球根肥大及開花，在較高溫下，葉易變黃，球根瘦小。

由上而下：水仙、瓜葉菊、大岩桐、秋海棠

# 草莓番石榴盆栽

郭瑞祥

草莓番石榴的學名是 *Psidium littorale*, Raddii. 別名 Chinese guava (中國番石榴), 土名榕樹番石榴, 因其葉子極似榕樹葉。

草莓番石榴成熟果實，不僅風味酸，且含有甘味，果皮色澤與味道都與草莓極為相似。

原產巴西，與番石榴同屬，外表形狀兩者大略相同，唯一顯著不同的是葉子，因與榕樹的葉子很相似，才有土名榕樹番石榴的名稱。樹形不大，為小喬木的一種，枝條彎曲，且分枝多，向四面擴展，適宜做庭園樹。

樹皮呈黃褐色或赤褐色，光滑或作薄片狀剝離，老枝為灰白色，嫩枝是淡綠色，光滑而且很美麗，枝幹也可供吾人觀賞。

葉片為革質，全緣，呈倒卵形或橢圓形，先端鈍或短尖，基部銳或呈楔形，表面暗綠色，葉子兩面光滑。

普通在五月中旬左右開花，但是若值氣溫稍高時，會提早一點開花，反之若此時氣溫還低時，會延後一點開花，開花期與當時的溫度高低息息相關。

果實普通在八至九月間成熟，果實呈球形，果實小時顏色呈青綠色，而後漸變為綠色、淡紅色到最後的紫紅色。而且質薄，果實肉質柔軟，種子小。普通果園栽培者所結果實稍大，而盆栽所育成的果實則較小。

草莓番石榴的繁殖方法，有播種法、扦插法與嫁接法三種，其中以種子播種法為主，也最普遍。

播種：果實成熟後立即採種，春天播種約一〇至一五日後發芽，比普通番石榴播種後的發芽期間稍慢，盆栽用苗取一年生者即可，也就是隔年春天即可用來做盆栽的材料。若盆栽用苗過大時，須行斷根與修剪。

扦插：普通在春天扦插，育苗床須有遮蔭設備。行扦插時插枝須用植物荷爾蒙處理過，便於日後插枝易生根。

嫁接：與一般番石榴的靠接方法相同。

就因其樹形不大，枝條多彎曲，葉子又極似榕樹葉子，果實不大，顏色呈紫紅色，枝條光滑，優雅風緻，故用來做為盆栽很適宜。

用盆以一二英寸的素燒盆最合適，新者須先浸水，舊者則須洗去污物。

盆土使用黏質壤土混合腐熟堆肥或雞糞，其比例約五比一。

對枝條的固定與修剪須特別注意，草莓番石榴的枝條多呈彎曲狀，枝條選擇以蜿蜒狀為佳，加以固定之，便於育成吾人所想像的幽深高雅狀。葉子則配合枝條修剪，要知美麗的枝幹，若無恰到好處的葉子陪襯，則難以顯示出真實美及立體美，而給予吾人心靈的感受也將單調乏味。

大岩桐又名新寧治花，是多年生塊根植物，花期夏季，花大呈喇叭形，花有紅、紫、白等，並有紋斑、覆輪及重瓣等園藝品種。

株高約九英寸，除播種以外，尚可以分割塊根、芽插及葉插等方法繁殖。適於半日蔭下生長，濕度宜適當，避免葉部直接灌水或淋雨，以免葉片腐爛。

此兩種植物，需溫暖的環境，全日照或間接日照均可，應保持潮濕。

番紅花也是多年生球根植物，花期由晚冬至中春，花色變化多，已栽培出許多花園品種，可植於花園或矮草中，鱗莖可持續多年。

紫羅蘭、大岩桐：紫羅蘭稱為小紫羅蘭花，是二年生半耐寒草本植物。花期夏季，其野生種現已不於花園栽培，但其許多變種經年產生。花有單瓣及重瓣者。株高一至二·五英尺，三至四月播種於溫室，四至五月挖起種苗而植於室外即可。

掛蘭：多年生植物，株高至一二英寸，葉細長，如草狀，色綠帶有象牙色的條紋，典型的綠色為邊緣，象牙色為中心。花小而白，但不一定會產生。

接着是產生一叢幼株，若將這小叢固定於小鉢內，則生根而繁殖。

任何肥沃土壤均可種植。

溫度不宜太高，需光照良好，夏天行遮蔭。

掛蘭為有名的室內裝飾植物，可種成花籃狀而用於懸掛，十分有趣。

櫻草：此即普通櫻草，為良好庭園花卉，是多年生高山植物，花期春季，花色淡黃，具暗黃色斑點。

株高四至五英寸。可於露地栽培，行分株法繁殖，宜選壤土栽培，日照充足或日蔭處皆可。

喜稍涼氣候，要潮濕，應避免通風而乾涸，若置於溫室或室外，可得重覆的開花。

大花紫鴨跖草：是多年生草本植物，花期夏季，花呈紫藍色，為繖形花序，花徑約一英寸。

葉為帶狀，暗綠色，平滑，約有一英尺長。可在春天播種於露地，或行分株。可栽植於一般花園土壤，陽光直射或稍陰處。

要潮濕，但略乾也無妨，光度充足則生小花，種成懸掛式極美觀。

大岩桐又名新寧治花，是多年生塊根植物，花期夏季，花大呈喇叭形，花有紅、紫、白等，並有紋斑、覆輪及重瓣等園藝品種。

株高約九英寸，除播種以外，尚可以分割塊根、芽插及葉插等方法繁殖。適於半日蔭下生長，濕度宜適當，避免葉部直接灌水或淋雨，以免葉片腐爛。

此兩種植物，需溫暖的環境，全日照或間接日照均可，應保持潮濕。

掛蘭：多年生植物，株高至一二英寸，葉細長，如草狀，色綠帶有象牙色的條紋，典型的綠色為邊緣，象牙色為中心。花小而白，但不一定會產生。

接着是產生一叢幼株，若將這小叢固定於小鉢內，則生根而繁殖。

任何肥沃土壤均可種植。



盆栽草莓番石榴

