

農業信箱



春蘭栽培

〔問〕：台灣產春蘭如何栽培？
（北縣萬里鄉磺潭村公館第四九號林清田）

〔答〕：台灣產春蘭的栽培法：
四、五月間分株繁殖，培養土宜用腐葉土混合沙石。

春蘭喜潮濕，但培養土必須排水良好。在不燒傷的情形下，日照較充足則開花良好。（王才義）

金針菜栽培

〔問〕：（一）適於栽種金針菜的土壤是那一種？

（二）本省那一地區適合種植？

（三）有幾種栽培品種？

（四）栽植時期及行株距如何？

（五）施肥量如何？

（六）如何防治病虫害？應於何時噴農藥？

（七）種多久可採收？可採幾年？如何採收？

（八）種苗何處買？（新竹縣新埔鎮巨埔里八〇號溫文標）

〔答〕：（一）金針菜適於保水良好且排水良好的紅壤土或沙質壤土，土壤反應以微酸性最適宜。

（二）以本省的氣候條件而言，北部

、中部、東部較適宜。新竹亦適合栽培。一般多利用山坡地或茶園栽植。

（三）栽培品種以小葉種（黃花黃蕊）、大葉種（紅花南洋種）及黃花黑蕊種為多。東部花蓮一帶種植大葉種為多。

（四）一年四季都可栽植，但以二、四月最適宜，因為此時雨水較多，成活率高。行距五〇～六〇公分，株距二五～三〇公分。

（五）金針菜是多年生作物，宜施用堆肥，每公頃堆肥用量約一五、〇〇〇～二五、〇〇〇公斤，過磷酸鈣一五〇公斤，草木灰六〇〇公斤作基肥。以後視生育情形施追肥，每公頃每次施用尿素四〇～六〇公斤。

（六）金針菜易發生蚜蟲，要在種植前施用「好年冬」，每公頃一五～二〇公斤，然後定植。

噴藥應在開花前，開花期避免噴藥。金針菜花期均在七月下旬～九月上旬。如在採收期還有蚜蟲為害，可噴射魚藤精。

（七）種植一年才能採收，可繼續採收數年。如果過密，可疏株，然後施肥管理，至少可採十年。

產量視生育情形而定，每株可採一、一五公斤鮮花蕾，每一〇公斤鮮花蕾可製造乾金針花一公斤（乾燥率一〇%）。

如以每公頃栽植五〇、〇〇〇株計算，鮮花蕾產量可達到五〇、〇〇〇～七五、〇〇〇公斤。

（八）南洋種宜請花蓮區農業改良場介紹，其他品種因栽培面積零細，恐無出售種苗處。（王進生）

年青的一群，熱誠的服務！



謹介紹第一個來自北歐的殺菌劑，瑞典 Casco Gard 公司出品

新靈 SYLLIT[®]
65% 可濕性粉劑

最佳防治：梨、蘋果：黑星病、炭疽病、白粉病，桃縮葉病
及一般果疏花卉之真菌性病害。



英國 A.H. MARKS 公司出品

蕃茄旺 蕃茄，茄子生長素
2,4-地鈉塩 除草劑
大殺草 達諾殺除草劑

美國 THOMPSON-HAYWARD 公司出品



唯一無殘毒之殺蟲劑

百克 BIOTROL XK.[®]
可濕性粉劑

防治：蔬菜小菜蛾，擬尺蠖，青蟲，
果樹毛蟲，森林松毛蟲及其他
鱗翅目幼蟲。

台灣總代理：德城行有限公司

台北市太原路154-8號(四樓)

電話：5510393 • 5517003

水道塞私 違犯法律

高雄縣六龜鄉老濃村
二九號林溪林先生問：

二十年來某甲家用及果園用水均引自村後約一公里的山泉溝渠。最近某乙、某丙爲便利自己引水，相繼於上游距某甲取水處約一百公尺及一百五十公尺，以水泥封閉溝渠。致使某甲無水可用。

某乙、某丙原另有可供五十餘戶飲用及灌溉的大水溝，如今棄大取小，奪占他人水源，是否觸犯水利法或其他法律？某甲應如何處理？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：

未得主管機關的許可而私鑿水道者，除限令回復或廢止外，處一千銀元（新台幣三千元）以下罰款。

未經主管機關的核准，建造引水的建造物，而擅行或妨碍取水用水者，處五百銀元以下罰鍰。因而損害他人權益者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

水利法第九二條、四六條第一項第二項，九三條分別著有明文。

某甲得依水利法向該管縣政府檢舉選請取締，早日回復水道的暢通，亦得依民法第七七五條第二項、第一八四條訴請法院判令某乙、某丙除去妨碍及賠償所生損害。

南投縣國姓鄉石門村國姓路二四九號羅乾富先生問：

某甲於自己土地興建房屋時，曾將自己與某乙相鄰界址，內縮一公尺，作爲排水溝。現在某乙新建房屋，越界占用某甲三公分。

請問：(一)某乙與某甲既不共用牆壁，依建築法是否應相距三公尺興建？(二)越界占用情形如何解決？(三)某乙屋頂的水，直注於某甲土地上，應如何解決？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：

(一)貴地因非實施都市計畫的地區，尚無建築法之適用（建築法第三條第一項第二款）。(二)土地所有人建築房屋逾越鄰界者，鄰地所有人，可以訴請法院判令拆除越界部分的房屋。

但如鄰地所有人早知其越界，並未立即提出異議，此種情形只可以請求以相當的價額，購買該部分的土地，但不得請求拆除房屋（民法第七六七條上段、七九六條）。

(三)土地所有人，不得設置屋簷或其他工作物，使雨水直注於相鄰的不動產（民法第七七七條）。

某甲可以制止或請求某乙改善，避免水直接宣洩情事發生。



法律問題解答

建屋越界 依法補償

雞母珠多野生

〔問〕：種植雞母珠，前途如何？目前是否可以種植？如何種植？適合於什麼土壤？（台南縣東山鄉王文義）

〔答〕：目前雞母珠只作試驗用，用量有限，所以現在雞母珠都是野生，並未有人種植。由於用量不多，目前亦不宜大量種植。將來前途如何，須待臨床試驗後才能決定。

此類研究，需作數年才有進展。如想種植，本省各地均可，而以腐植壤土爲適。種植期多在三月上、中旬。（徐原田）

鋸鹿茸的技術

〔問〕：(一)我家養一對水鹿，雄鹿於農曆六二年十一月五日第一次脫角，六三年一月一三日鋸茸，沒想到六月六日又脫角，這是何原因？(二)母鹿於六三年五月六日產子，至八月滿三個月，那時雄鹿鋸茸也達七〇天了，如此雄鹿能否配種？會不會失去配種的時期？

〔答〕：(一)雄鹿體型龐大，力氣又大，如要鋸茸實感費事，不知有何方法，既方便又能使鹿減少痛苦？(花蓮縣壽豐鄉壽豐村一〇五號林灶生)

〔答〕：(一)關於公水鹿在半年內連續發茸兩次並非奇蹟，這是公鹿的內分泌（荷爾蒙）不正常引起的。本省曾多次發生此種現象。

不正常發茸的兩次產茸總量，少於或等於一次正常產量。

鹿茸的生長，硬化成角，鹿角脫落（解角）等現象與內分泌素（荷爾蒙）的分泌和營養的供應有密切關係，原因有二：

(1)當公鹿去勢後，缺乏睪丸激素（Testosterone）的分泌，會引起不正常發茸、解角的現象。

(2)當公鹿的營養不良，只供應單味飼料，缺乏維他命A，年齡較大時也會造成不正常發茸現象。

林農友的公鹿不正常發茸的原因，可能屬於第(2)原因。

糾正方法：充分供應平衡的飼料，種類要多，尤其多補充胡蘿蔔。暫停配種，待下季正常發茸，才可供配種。

(二)母鹿產子後三個月離乳，雄鹿鋸茸後七〇天，即可配種，不會錯過配種時期。

(三)雄鹿體型龐大，力氣又大，如要鋸茸，無適合的設計、工具及老練的技師，的確不易。

一般鋸茸舊法是用特製的籠架，將鹿趕入籠中，待頸部入架後，固定四肢及頭部，然後以細齒鋸迅速鋸下鹿茸。

此法缺點是，有許多大小不一的雄鹿時，也要有多種大小尺寸不同的籠架多個，成本大且不便。

今有一新法，就是利用鹿舍的一角設計一個鋸茸室，將雄鹿趕入後，即可隨鹿軀體大小，迅速調節固定而鋸取鹿茸，此法甚爲方便且安全。

如農友們有興趣，可至廖欽淮先生所經營的養鹿場參觀此一新設計（地址在新竹縣新埔鎮水汴頭一四號），並可當面請教他鋸鹿茸的經驗。（廖貴橙）