

農業信箱



春蘭栽培

〔問〕：台灣產春蘭如何栽培？
（北縣萬里鄉磺潭村公館第四九號林清田）

〔答〕：台灣產春蘭的栽培法：
四、五月間分株繁殖，培養土宜用腐葉土混合沙石。

春蘭喜潮濕，但培養土必須排水良好。在不燒傷的情形下，日照較充足則開花良好。（王才義）

金針菜栽培

〔問〕：（一）適於栽種金針菜的土壤是那一種？

（二）本省那一地區適合種植？

（三）有幾種栽培品種？

（四）栽種時期及行株距如何？

（五）施肥量如何？

（六）如何防治病虫害？應於何時噴農藥？

（七）種多久可採收？可採幾年？如何採收？

（八）種苗何處買？（新竹縣新埔鎮巨埔里八〇號溫文標）

〔答〕：（一）金針菜適於保水力好且排水良好的紅壤土或沙質壤土，土壤反應以微酸性最適宜。

（二）以本省的氣候條件而言，北部

、中部、東部較適宜。新竹亦適合栽培。一般多利用山坡地或茶園栽植。

（三）栽培品種以小葉種（黃花黃蕊）、大葉種（紅花南洋種）及黃花黑蕊種為多。東部花蓮一帶種植大葉種為多。

（四）一年四季都可栽植，但以二、四月最適宜，因為此時雨水較多，成活率高。行距五〇～六〇公分，株距二五～三〇公分。

（五）金針菜是多年生作物，宜施用堆肥，每公頃堆肥用量約一五、〇〇〇～二五、〇〇〇公斤，過磷酸鈣一五〇公斤，草木灰六〇〇公斤作基肥。以後視生育情形施追肥，每公頃每次施用尿素四〇～六〇公斤。

（六）金針菜易發生蚜蟲，要在種植前施用「好年冬」，每公頃一五～二〇公斤，然後定植。

噴藥應在開花前，開花期避免噴藥。金針菜花期均在七月下旬～九月上旬。如在採收期還有蚜蟲為害，可噴射魚藤精。

（七）種植一年才能採收，可繼續採收數年。如果過密，可疏株，然後施肥管理，至少可採十年。

產量視生育情形而定，每株可採一、一五公斤鮮花蕾，每一〇公斤鮮花蕾可製造乾金針花一公斤（乾燥率一〇%）。

如以每公頃栽植五〇、〇〇〇株計算，鮮花蕾產量可達到五〇、〇〇〇～七五、〇〇〇公斤。

（八）南洋種宜請花蓮區農業改良場介紹，其他品種因栽培面積零細，恐無出售種苗處。（王進生）

年青的一群，熱誠的服務！



謹介紹第一個來自北歐的殺菌劑，瑞典 Casco Gard 公司出品

新靈

靈

SYLLIT

65%可濕性粉劑

最佳防治：梨、蘋果：黑星病、炭疽病、白粉病，桃縮葉病
及一般果疏花卉之真菌性病害。



英國 A.H. MARKS 公司出品

蕃茄旺

蕃茄，茄子生長素

2,4-地鈉塩

除草劑

大殺草

達諾殺除草劑

美國 THOMPSON-HAYWARD 公司出品

唯一無殘毒之殺蟲劑



百克

BIOTROL XK.

可濕性粉劑

防治：蔬菜小菜蛾，擬尺蠖，青蟲，
果樹毛蟲，森林松毛蟲及其他
鱗翅目幼蟲。

台灣總代理：德城行有限公司

台北市太原路154-8號(四樓)

電話：5510393 • 5517003