

蕉園覆蓋

①蕉園用無病虫害的香蕉葉、稻草或PE塑膠布等覆蓋，有如下的利益：

(1)可抑制雜草發生，節省中耕除草的勞力。

(2)減少蒸發，保持水分。

(3)增加養分。

(4)採用黑色PE布覆蓋，有下列優點：①節省人工除草，②冬季增加地溫，保持濕度，可促進香蕉發育，提早採收並增產五%左右。

灌溉排水

香蕉葉片大，蒸發快，需要多量水分，尤其是抽穗時需水更多，因此冬季乾旱季節，每十、二十天應視情形灌溉一次，但切勿灌溉過多，雨季需加強排水，否則下雨幾天，排水不良蕉園，品質即劣變，蕉園四周與行間，需有不同深度的排水溝。

刈除枯葉

植株上枯葉太多時，陰影過多，影響生長，又易誘致病虫害，尤其是莖象鼻虫，噴藥時也增加藥品的消耗量，果實容易發生擦傷，影響外銷。植株遇強風亦易倒伏，因此應隨時清園，刈除枯葉。

留芽・除芽

香蕉母株結果採收後，不會再結果，如留第二代結果，要預先留根際的吸芽，養成後接替母株。高屏平地應留三、五月出土的萌芽，以供第二

年結果。中部可留五、六月的萌芽，以生產第二年七、九月香蕉。應選擇基部粗大，先端如箭尖，生長在土壤較深的優良吸芽。

爲了預防颱風的損傷，可留二芽，一大一小，等風期過後選擇優良的留一株，以免消耗養分。無用多餘的，應隨時除掉，除芽時應將生長點切除，否則會再長出。或者以刀將萌芽地上部分切掉，以小刀將生長點刻傷，或滴二CC煤油，這種方法母株比較不會倒伏。

疏果・套袋

香蕉開花二、三個果手後，應加如果房防病虫害噴藥，噴射TBZ（腐絕）藥劑一公克加加寶利一公克，展着劑（出來通）一公克加水一公斤，開花後，一面將無用的雄花花苞摘掉，並視情形疏掉一部分果手，然後再用上述藥劑再噴射一次，即用藍色PE塑膠袋將果房套袋，這樣可使果實沒有黑星病、黑斑病、水銹。

套袋不但可以減少擦傷、病虫害、日燒，增進色澤，使品質顯著提高，並且可增加產量約一〇%。

開花期的標誌爲採收熱度的依據。香蕉開花時可在套袋上或支柱上做某種記號，代表開花日期，供做採收期的依據，使採收熱度一致。

防風支柱

植株高大或果房肥大後，重量增加，易被強風吹倒或折斷，甚至下雨亦容易倒伏，應隨時立防風支柱。豎立支柱方法是將竹桿插入土中二尺，可採用挖孔機以節省勞力，使竹桿立

年青的一群，熱誠的服務！



謹介紹第一個來自北歐的殺菌劑，瑞典 Casco Gard公司出品

新靈

SYLLIT

65%可濕性粉劑

最佳防治：梨、蘋果：黑星病、炭疽病、白粉病，桃縮葉病及一般果蔬花卉之真菌性病害。



英國 A.H. MARKS 公司出品

蕃茄旺 蕃茄，茄子生長素

2,4-地鈉塩 除草劑

大殺草 達諾殺除草劑

美國 THOMPSON-HAYWARD 公司出品

唯一無殘毒之殺蟲劑



百克

BIOTROL XK.
可濕性粉劑

防治：蔬菜小菜蛾，擬尺蠖，青蟲，果樹毛蟲，森林松毛蟲及其他鱗翅目幼蟲。

台灣總代理：德城行有限公司

台北市太原路154-8號(四樓)

電話：5510393・5517003