

於葉中間，植株分上、中、下三段，用塑膠帶縛在竹桿上，並隨時依植株的高大而調整縛繩位置。如香蕉植株已向一方傾斜，應該用二枝竹桿分叉支撐。最好採用防腐支柱，雖然成本較高，但可耐用三年，因此比普通支柱更為經濟且有效。

病虫防治

葉斑病：葉斑病亦稱黑條病，為本省香蕉重要病害，嚴重影響品質與產量，多發生於雨季，自下雨後即應該防治，每二星期噴藥一次。高屏地區多採用空中噴藥，但零星蕉園，必須採用地面噴藥。

藥劑：大生M45二·五公升，礦物油六·八公升加展着劑八〇CC，加水三〇公升。

萎縮病：萎縮病亦為香蕉嚴重的一種病害，為一種病毒病，無法防治。應效法澳洲分區採用法令防治法，嚴禁蕉苗隨便搬運，強迫掘毀病株，種植與移動蕉苗，必經許可，並繁殖無病蕉苗，以供種植，隨時防治蚜虫，才可徹底撲滅該病。病徵是植株矮小，葉柄縮短，葉片變為狹長，向上直立而不下垂，因此葉片簇生於偽莖頂端成漏斗狀。

防治法：本病到現在還沒有任何藥劑可以直接防治，只有採用間接防治，因該病以黑色蚜虫為傳染媒介，因此應該防治蚜虫。

(1) 病株煤油處理，患病植株發現後，應立刻灌注煤油，每株一〇〇、三〇〇公分，以殺死蚜虫。

(2) 徹底掘毀病株：病株以煤油處理後，最好徹底掘毀病株，並噴射馬拉松殺除蚜虫，病株不可放置蕉園，

以免蚜虫傳布毒素。

黃葉病：在佳冬、林邊、新園一帶發生，有蔓延趨勢，為一種土壤病菌為害，被害後養分輸送系統遭受破壞。香蕉樹幹切開變為棕褐色，葉片變為黃色，使植株枯死。目前仍無藥防治，只有廢耕，改種其他作物，病區蕉苗絕對不能移出種植，農具均要消毒。

假莖象鼻虫：蕉象鼻虫的幼虫和成虫都為害植株的假莖，葉的主脈和果梗，尤以梢部和中部為害最烈，被害蕉莖自虫孔流出糊狀汁液，內部組織腐爛，影響養分輸送，嚴重者自為害部分折斷，完全沒有收成。

防治法：(1) 清園：要隨時刈除枯葉，因該虫多潛伏於假莖內，最好砍除收穫後的殘株。

(2) 藥品防治：過去噴射一八·八%地特靈乳劑三〇〇倍液或五〇%地特靈可濕性粉劑七〇〇倍液。但該藥已禁止使用，可改用四〇%三落松乳劑一、六〇〇倍噴射。


球莖象鼻虫：俗稱舊型象鼻虫，為害地下球莖和靠近地面的偽莖，輕者影響產量，嚴重者整株倒伏，新植幼苗如有腐爛，亦容易被該虫危害，這種病虫分布全省各地，近來甚為普遍，應加以防治。

防治法：(1) 掘除殘株，清園。(2) 嚴禁虫區蕉苗移出。(3) 更新，香蕉連續栽培，球莖象鼻虫為害較為嚴重，如勵行更新，可以減少為害。(4) 蕉苗種植前用地特靈三〇〇、五〇〇倍液處理。(5) 藥品防治以繁福松粒劑(每株六〇公克)或大福松乳劑，噴射在偽莖中、下部及植株附近三〇公分地面。(6) 新植時，改用塊莖種植。

HONDA

本田技研株式會社出品

原裝鐵牛



6.8馬力

好消
息

F 65 無段變速

本田耕耘機

最輕便(只95公斤)

最理想(自動離合器)

前進8速，後退1速，附有左右可任意轉彎之離合器及自動クラッチ。

適合濕田、旱田、山坡地、梯田等之犁耕、碎土、整地、除草之用途。

※徵求經銷商

豐達行 台北市博愛路26號 電話：3317251~4

北區：廣泉農具工廠 電話：5413682

台北市迪化街一段276號