

式波爾多液或六〇〇倍氧化亞銅液。

(3) 受害枝葉須隨時摘除並燒燬。

紅知蛛：在高溫乾燥的條件下最易大發生，尤其銅劑的連續使用最易提高為害程度，須隨時噴藥防治。

防治紅知蛛的農藥種類很多，如有機氮劑中的三五%大克蟻乳劑八〇〇倍液，二五%克氯苯乳劑一、〇〇〇倍液。

有機硫磷劑中的一八%殺蟻多乳劑七〇〇倍液，五七%歐蟻多乳劑一五〇〇倍液，有機磷劑中四六·五%愛殺松乳劑八〇〇倍液，四〇%安滅松乳劑一、〇〇〇倍液。

有機氮劑中五〇%必斯靈乳劑一、〇〇〇倍液，六〇%必斯靈可濕性粉劑一、二〇〇倍液，有機鋅素劑二五%能死蟻乳劑四〇〇倍液，有機錫劑五〇%錫螨丹可濕性粉劑二、〇〇〇倍液。

以及混合劑六〇%亞殺蟻乳劑一二〇〇倍液，五〇%大滅蟻可濕性粉劑一、〇〇〇倍液等均有殺虫之效。

但是紅知蛛對農藥甚易產生抵抗性，須輪流使用各種農藥。

介壳蟲類：誘蜱是象皮病（火燒樹）發生的原因。若於夏季在果實果梗部發現灰塵狀物質時，則須噴射鋅乃浦、鋸乃浦、鋅鋸乃浦八〇〇倍液或波美二八度石灰硫黃合劑八〇倍液作防治工作，果實未成熟期適用前種藥劑，到達成熟期後以採用後種藥劑為妥。

夏天因氣候適於病蟲害的活動，因此各種病蟲害的發生最為嚴重。其中為害程度較為嚴重且易影響樹勢及果實品質者有：潰瘍病、紅蜘蛛、鑄蠅及各種介壳蟲類等。

潰瘍病：至今仍無適當治療方法，僅能作預防工作。

預防方法如下：

(1) 強風地帶種植柑桔（甜橙及寧蒙最需注意）或設置苗圃時，須設置防風林。

(2) 夏季須每隔一、二星期噴射一次四、四

六〇%愛速靈加水五倍或一五%愛速靈加水一倍半液，用油漆刷塗刷於樹幹上的方法，既可免傷天敵。

同時亦可殺死紅蜘蛛、蚜蟲以及其他吸收口器害蟲及潛葉蛾幼蟲等，最為經濟而理想。



生長良好的桶柑（阿郎）

## 加強病蟲害防治

台糖公司現已積極研究利用製糖副產品，配製成糖蜜蔗渣完全養牛飼料，不用牧草，直接飼於肉牛肥育，試驗結果，極為成功。

在本省有限土地，草源供應困難的情況之下，無異轉養牛界開拓了一條嶄新的康莊大道。

## 台糖牛飼料新配方

養牛飼料配方 原 料 配 比 料 配 合 (%)	15	15	15	40	10.5	1.5	2	1	0.002
糖 蘭 蘭 玉 豆 去 尿 食	蜜 渣 體 米 粉 酸 鈣 素 塵	飼 料 配 方 所 含 營 元，而且 精 肉 量 多 出 售 收 入 更 可 增 加。光	營 白 質 細 分 物 量 (%) 13.4 55.91 20.70 3.49 43.34	營 級 乾 粗 灰 無 (抽)					
		全期節	省五六元，而且 增重費用，糖蜜蔗渣組亦比普通飼料加牧草組，每公斤要節省二·八三元						
		，而且增重快速，每隻日增重約達一公斤以上，縮短肥育時間。							
		飼用台糖公司糖蜜蔗渣完							

介壳蟲類：夏季發生的介壳蟲類很多，可使用農藥種類亦很多：如五〇%大滅松乳劑一、〇〇〇倍液，五〇%馬拉松乳劑八〇〇倍液或二五%福木松乳劑五〇〇倍液等均有防治之效。

但這類農藥如果連續使用反會消滅天敵，引起反效某。

六〇%愛速靈加水五倍或一五%愛速靈加水一倍半液，用油漆刷塗刷於樹幹上的方法，既可免傷天敵。

同時亦可殺死紅蜘蛛、蚜蟲以及其他吸收口器害蟲及潛葉蛾幼蟲等，最為經濟而理想。