

寧蒙病虫防治

〔問〕：㈠我們由市面買回來的寧蒙裡面的種子，是否可以播種？㈡栽培期間要噴何農藥以防病虫害？㈢種幾年才可以結果？（新竹市白由路四十三號孫和）

〔答〕：㈠由市販寧蒙所採的種子播下後，亦可得寧蒙苗，但此苗木須經嫁接才能得正常苗木。因種子直接生長的實生苗，未帶柑桔毒素病，生長旺盛，但樹冠甚大，結果期晚，果型大，果皮厚，果汁少，經濟栽培價值較低。㈡寧蒙樹最怕天牛與潰瘍病爲害。天牛防治可採用五〇%地特靈可濕性粉劑，加水一〇〇倍液，於四～六月間每隔一個月噴射於樹幹離地二台尺以內的基部。

潰瘍病防治方法：

(1)盡量避免在强風處種植寧蒙，寧蒙園周圍宜設防風林。

(2)春芽前散布一次四～四式波爾多液。

(3)五～九月，每隔三～四週散布一次四～四式波爾多液或氧化亞銅六〇〇倍希釋液。

㈢種植後二年可開始結果，但較多量的結果是在五年以後。（翁仁祿）

藕施肥

〔問〕：㈠我種水藕約一分多地，現在已很高但水藕葉會枯萎，是何病？㈡水藕施肥量要如何分配較好？㈢水藕田是否要有充分水量或不必田間有水？㈣應如何全部採收藕？（屏東縣長治鄉昌隆一街二二號蘇慶興）

〔答〕：㈠依所述病徵，爲葉斑病，請噴射大生四五可濕性粉劑四〇〇～五〇〇倍液（須加用展着劑）。㈡一〇公畝的肥料用量約如下：

(1)基肥：用堆肥二〇〇〇公斤，過磷酸鈣六〇公斤，氯化鉀二〇～二一公斤。於整地前，全面散施，與耕土充分混合。

(2)追肥：自發芽後（即小蓮葉浮於水面時）一〇天起，每二〇天施肥一次，繼續施二次，每次用硫酸鋁二五公斤，氯化鉀五～六公斤。肥沃土壤應適量減少施量。

㈢經常保持水深五～十二公分。降雨時亦須注意排水，以免因積水過深影响生育。

㈣如欲將藕全部收穫，必須用狹長的齒耙挖取。見有粗大無皺的枯葉柄，即可斷定下面有藕。（王進生）



精實 !!

興農交配 元寶白菜 播種後55天可收成，移植48天二公斤，球質沒有黑的斑點，試種用附郵20元。

新秋甘藍 品質、甜度、口味、耐病、快收，（50天收成，冬天不尖型，改良完成了。）

旭光番茄!! 員林區人氣最旺盛品種 **旭光六號番茄** 赤桃紅品質最佳之品種

大型旭光二號番茄 黑壳大型豐收品種

日光番茄，五光番茄，東光番茄 去年分發各地試種，已得到農友們的信任。

各地有名種子行有售 興農 請認明商標

總輸入 林興農行股份有限公司

興農種子行

台北縣三重市重新路三段一〇八號 電話：九七一二六三四號

郵政劃撥四〇二八號