



蘋果 (羅小風)

更新鳳梨園 提高產量品質

——黃榮瑞——

鳳梨種植四、五年後，必須更新；如不更新，將無經濟栽培價值。但鳳梨廢耕園最後一次收穫係在一月冬果採收後，而更新栽植期則在八、九月，在這七、八個月的漫長休閑期中，應該將鳳梨老株切碎後掩埋入土中，或播種綠肥，以增加有機質，提高地力。

更新處理法

在鳳梨最後一次收穫之後，或栽植前通常可用下列方法處理：

(1) 鳳梨老株埋入土內：在春季將鳳梨老株掘取，翻埋入表土內三〇

公分，至秋季再行整地，然後栽植。

(2) 播種綠肥：在春季將鳳梨老株掘除移出田外，地面耕鬆，播種綠肥作物（虎爪豆等），至秋季（於預定種植鳳梨前約二星期）把綠肥作物翻埋入土，然後栽植鳳梨。

(3) 於春季將鳳梨老株掘除，切成碎片覆蓋地面，至秋季翻犁埋入土內，然後栽植。

(4) 在鳳梨栽植前，將老株焚毀後掘除老株，然後翻埋入土內，再行栽植。

(5) 在鳳梨栽植前，始將老株掘除移出田外，然後開地栽植。

年青的一群，熱誠的服務！



謹介紹第一個來自北歐的殺菌劑，瑞典 Casco Gard 公司出品

新靈[®] SYLLIT

65% 可濕性粉劑

最佳防治：梨、蘋果：黑星病、炭疽病、白粉病，桃縮葉病
及一般果疏花卉之真菌性病害。



英國 A.H. MARKS 公司出品

蕃茄旺 蕃茄，茄子生長素
2,4-地鈉塩 除草劑
大殺草 達諾殺除草劑



美國 THOMPSON-HAYWARD 公司出品

唯一無殘毒之殺蟲劑

百克[®] BIOTROL XK

可濕性粉劑

防治：蔬菜小菜蛾，擬尺蠖，青蟲，
果樹毛蟲，森林松毛蟲及其他
鱗翅目幼蟲。

台灣總代理：德城行有限公司

台北市太原路154-8號(四樓)
電話：5510393 • 5517003

• 徵求各縣市經銷商 •