

春季二、三月，秋季十、十一月行扦插。

軟枝黃蟬枝條節間長為其特徵，需選擇節間短粗之越年生枝條，剪取三節或四節，可照紫薇繁殖法，先行扦插於盆中，三分之二在土中，三分之一在地上，時時澆水，一個月後將苗移植於院中，空地處加腐熟有機質將土壓緊，早晚澆水。春季扦插者六、七月開花，秋插者翌年開花，花期達五月之久。庭院栽植需修剪及立支柱。最宜作棚架，大門頂上之攀登，非常美麗。

扶桑花：又名朱槿，學名 Hibiscus rosa-sinensis L. 錦葵科。

原產於中國南部，非洲東部及南美洲等地。常綠灌木，枝葉茂盛，耐旱性強。一般品種分為四類：單瓣朱槿、複瓣朱槿、南美朱槿、裂瓣朱槿，種類繁多。

葉青綠色有光澤，葉型因品種不同有長橢圓形、橢圓形及圓三角形，邊緣有鋸齒，有葉柄。新枝平滑有光澤，節間明顯，老枝粗糙，節間不明顯。花生於枝條先端數節，花柄長，花型因品種而有重



三色堇

三色堇 · 宜秋播

學名：Viola tricolor, Linn. 英名：Pansy, Heartsease. 堇菜科，原產歐洲，為耐寒性一年生草花。花語：快活的心情、懇情的回憶、思念我。

三色堇有美麗的傳說，為愛情的象徵，相傳愛神邱比特的箭，曾射及此花，致染上三色彩帶，後人以此花代表愛的奉獻。

三色堇又名遊蝶花、陽蝶花、人面花、貓兒臉。由於原種花上有白、黃、紫三色而名。

現在三色堇的品種，已有大輪花，顏色亦多，花瓣呈波浪狀，為一般愛花者，特別喜歡。

三色堇抗寒力強而抗暑力弱，一般多秋播。種子經夏季高溫，則發芽力驟減，故應乾燥冷藏。

三色堇在歐美，為重要的春季花壇用草花，盆栽也很理想。不論大花種或小花種，均可自行採種，一般在1~2月低溫時受粉，朔果在二月底成熟。因種子易自朔果彈出，採種應於朔果變黃，即行採下。(林進益)

瓣、單瓣、裂瓣等。

花色有紫紅、大紅、桃紅、粉紅、金黃、枯黃、白色、肉色等多種。花朵直徑可達三〇公分左右，四季開花，最富艷麗色彩變幻，瑰麗無比，最適宜建築物、住宅附近及屋頂等地美化。

扶桑花之栽培，以稍黏的黏質壤土為佳，但需排水良好，否則易生根腐病，要注意。繁殖分春、秋季扦插，在北部春季扦插較優於秋季。秋季扦插需覆蓋四周，保持地溫。

扦插時選擇發育充實的越年生枝條，剪取一五~二〇公分，先扦插於空地邊或盆中，加以澆水、拔草等管理。俟苗高三〇公分許，移植於日照充足、排水、通風良好之地，再加腐熟基肥攪拌、澆水，即可發育成強壯花木。秋季扦插翌年開花，春插者當年開花可供觀賞。

扶桑花在生長期間要注意蚜虫，及粉介壳虫為害。蚜虫可用馬拉松一千倍，粉介壳虫用馬拉松乳劑八百倍加夏油十分之一稀釋混合，噴灑葉及枝條，即可防治。

美國默克大藥廠出品



霉敵340

MERTECT 系統性殺菌劑



防治：洋菇褐痘病

優點：

1. 經濟部最新推薦，安全可靠。
2. 對洋菇無藥害，不會延期出菇。
3. 可刺激洋菇生長，增加產量。

防治：柑桔儲藏期病害

優點：

1. 延長儲藏時間。
2. 調節市場需要提高售價。
3. 減少腐損，增加收益。

台灣總代理：美商新美公司

台北市八德路三段20號 台資大樓八樓
電話：7719163~6 (四線)