

使用農藥 要注意安全

李園棋

(一) 噴藥時，必須配戴防護衣具。

(二) 噴藥中，不慎觸及藥液

，應立即用肥皂洗淨。

(三) 噴藥後身體和用具應加洗淨。

(四) 用完的藥瓶深埋土中或燒燬。

(五) 農藥應存放在孩童和家畜不易接觸的安全地方。

(六) 勿使農藥噴射於牧草、飼料或即將採收的蔬果上，因農藥殘留其上，易造成人畜中毒。

本省位於高溫多濕的亞熱帶地區，病虫害特多。農友為減輕作物損失，常利用各種不同方法，來保護農作物正常的生長，以防止病虫害的發生，如：農藥的使用，栽培法的改良以及抵抗性品種的選擇等，其中以農藥防治法最為經濟、迅速和有效，而且農友使用也最普遍。

農藥大部分具有劇毒性，雖然可殺滅農作物的病虫害。同時，也造成了對人類的危害性，加以農藥種類的繁多，農友又不了解各種農藥的性質和正確的使用方法，往往發生農藥中毒情事。

農藥中毒的原因可分為下列數點：
 (一) 農民使用農藥過程中，不慎將藥液吸入肺中，或藥液接觸皮膚而進入體內。

(二) 農藥使用後，未到安全期即行收穫，因此蔬菜、水果、谷類中，往往殘留許多農藥，引起食物中毒。

(三) 農藥放置地點不適當或用過容器隨地拋棄，因孩童和家畜接近，引起意外中毒。

為防範農藥中毒，施藥時必須特別注意安全，務必按照包裝標籤上的指示，在規定的時間內，以適當的濃度，噴射在規定的作物上。

施用藥劑時應注意下列事項：
 (一) 調配農藥時，千萬不可觸及原液，應盡量避免吸入藥味和藥劑的微粒。

(二) 容器不用時不可打開，也不可


在密閉室內混合藥劑。

農藥中毒可分為急性中毒和慢性中毒。一般口服或由皮膚滲透會引起急性中毒，至今尚無特效的解毒劑，因此一旦中毒就應趕快送醫急救。慢性中毒即農藥的殘留毒性，經由食物污染，直接或間接進入人體，在人體內長期累積，造成肝臟或其他器官的慢性中毒或退化，待累積毒量達到一定程度，由慢性轉變為急性中毒，一發就不可救治，如肝臟硬化等症。

政府為維護國民健康，嚴格的限制各種作物在收穫前施藥的時間，並嚴格的管制農藥殘留於蔬菜果實上的分量，在全省各大蔬菜批發市場及果菜公司設有農藥殘毒測定站，對超過安全容許量的蔬菜加以勸導或廢棄，這對於國民健康是一大保障。

最近國內對農藥污染的問題十分重視，不可否認的，農藥在植物保護上占有相當重要的地位，但農藥害人不淺，這也是事實。今後在還沒有發展出一種對人類絕對無毒害的農藥以前，促請農友特別注意施用農藥，同時蔬菜、水果在取食和烹煮之前，也應充分洗滌，以防止農藥中毒。

信譽的標誌




圓方牌農藥

消除雜草，怎樣選擇除草劑？請用雜草之大剋星：

巴拉刈

唯有本公司出品，才是真正優良之產品！



請認明
 標籤與鋅鉑封口上印有“”
 之榮譽標誌，才是真正巴拉刈

允發農化工廠有限公司 台北市萬大路225號
 TEL. 3316549·3710288