

提早開花結好梨

訪江春亮·江鳳雌農友

橫山梨是本省夏季比較普遍的應時水果之一，它的果肉清脆多汁又可口，很受消費者歡迎。目前零售每台斤約十元，比起二十世紀梨、巴梨等便宜了很多。

梨子好吃，但種梨並不容易。有人說：栽柑容易種梨難，也許是他們家家有本難唸的經吧！

在中南部，如果氣候正常的話，每株可結上三、四百台斤，可是在台北地區最多產下百餘台斤，一般都在七、八十台斤左右。爲什麼會有這麼大的差異呢？一句話可以概括——氣候不同。

春季是梨花盛開期，中南部大多是晴朗的好天氣，因此花開花謝都很正常，結果就沒問題，產量自然高。反觀北部的同期，正逢陰雨連綿的季節，只要花開期連下一個禮拜的雨，就結不了果，更談不上好收成。因此，台北地區栽梨，再好的收成也無法趕上中南部的產量。

談到種梨，住在台北市內湖區麗山街三三五巷二六及二八號的江春亮和江鳳雌兩位農友，他們都有十七、八年的種植經驗，記者特地請教他們如何栽培優良的梨樹。

江春亮農友首先表示：梨樹開花到結果，約須半年。如果運氣好的話，春天開花結果，但是生產期却碰上颱風季節。如果萬一遭到颱風的話，就只有乾瞪眼看滿樹梨果被糟蹋，多令人痛心！

爲了改變大自然不合理的排序，江鳳雌農友研究了很久，才想出從提早開花結果着手，控制在颱風期前收成，不但早生價格好，且可保收成。

經記者要求，江鳳雌農友毫無保留的提供了控制提早開花的藥方。

他說：藥材只要生石灰（六〇台兩）、硫磺末（一二〇台兩）及水二六公斤。首先將水煮沸，然後盛起備用，但應保持高熱的溫度。

其次把硫磺末加開水濕潤後，再將生石灰一併摻進共溶，約經三〇至六〇分鐘，此間不可受冷風吹襲，以免溶液凝固。此時以文火煮，徐徐加入備用熱水煮沸。經一分鐘後，才讓溶液慢慢冷卻，再經過濾即成，此時濃度約在二二至二五度間（以酸鹼度計測試），如果濃度在十八度以內則沒效果。

農曆十、十一月間，將此控制液噴射梨葉，很快就全部脫落，經過十天左右，即可促使開花，如此即可隨心所欲控制生產期了。

蚜虫和果蠅爲害梨葉和果實最嚴重，江農友特別用梨汁、紅糖、醋及工業用酒精混合液煮過後，盛裝在玻璃瓶內，然後懸在樹幹上，待果蠅及蚜虫飛入覓食時毒殺之，這種效果很好。

最後，江農友認爲，施肥應側重在有機肥的施用，其中雞糞和豆餅最好。農曆八、九月間，開溝施放有機和無機混合肥，三月間，在樹幹周圍撒布化學肥，更能促進根羣的發育和結果率。（阿郎）



呋克靈

(比加普)
可散性粉劑



農藥財發

英商卜內門化學工業公司 最新產品

PIRIMOR 50% D.P.

農藥許可証經市製字第586號

桃蚜的剋星，各種蚜虫類的專治藥劑。毒素病媒介的驅除者。

總代理：英商卜內門化學工業公司
台北分公司

總經銷：嘉泰企業股份有限公司

地址：台北市仁愛路三段26號二樓

電話：7716815·7812796

詳細說明書
備索

- 對有機磷劑具有抗性的蚜虫類（如桃蚜）有極優異的效果。
- 對天敵及有益昆蟲如蜜蜂等在一般用量下無害。
- 無不良的臭味，在水菓上不生污點，也不傷害植物的組織。
- 有良好的穿透作用，藥效迅速。
- 易溶於水，使用方便。