

(楊木林)

鹿的飼養管理

廖貴燈

北歐的拉卜斯 (Lapps) 人遠在數百年以前，就開始飼養馴鹿 (reindeer)。阿拉斯加 (Alaska) 的飼養鹿類，為時不過五、六十年。馴鹿放牧最廣泛地區，如北歐斯堪的那維亞北部的拉普蘭 (Lap-land)，阿拉斯加的北部與西部，加拿大的麥肯塞流域 (Mackenzie Valley) 以及西伯利亞若干零星地區，數量甚多。

日本的樺太、庫頁島、北海道等地，亦有相當數量的飼養或放牧。西伯利亞的通古斯人 (Tungus) 所養的馴鹿較野生者高大，除食用、乳用、皮毛等用途之外，並用來負重、拉車、乘騎，因為在苔原 (Tundra) 地區，馴鹿比馬強，每家所養的鹿，少則數百，多至成千。

在荷蘭人侵占台灣時，台灣與當時的暹羅、柬埔寨、菲律賓同為世界產鹿名地。因為台灣三百年前地廣人稀，水草豐茂，同時也沒有虎、狼、獅等

猛獸，所以鹿在原始森林中滿山遍野。在一六三八年 (荷據時代) 鹿皮之年銷售量高達十五萬張，通常每年也有七、八萬張。

至一六〇三—一七一四年，百餘年間，鹿羣因濫捕而陷於激減，當時政府雖曾下令禁掘坑和張網兩種捕法，後來大陸移民來台者日衆，墾闢鹿場為良田，任意捕殺野鹿。

然而鹿類年僅一產，每產僅一胎，不到數十年時間，台灣之鹿終趨銳減，而幾近絕滅。

國人認為鹿茸是名貴補品，開始時將捕獲的鹿隨飼，試圖馴化，割茸取利。起初不明其習性，飼養成績並不理想。當時只飼公鹿而將母鹿屠宰，因未能繁殖而數量一直很少。

民國四十幾年起，一些飼養者把畜牧學上的知識應用到鹿的飼養，使得鹿的飼養管理逐漸走上軌道。

依台灣農業年報資料：民國五十二年現存六七七頭，五十三年七四八頭，五十四年一、〇三三頭，五十五年一、六一六頭，六〇年一、六〇一頭，由此數字可看出繁殖率每年都有增加。

至目前為止，關於鹿隻飼養管理上的問題已克服了許多困難，但仍未臻理想。今後需要政府有關單位的輔導和學術界的繼續研究，將來企業性大規模飼養才能順利進行。

台灣四季如春，各地均適合養鹿，最近養鹿風氣很盛，對於鹿的飼養管理，也是各位農友所關心的。現將鹿的飼養管理方法，介紹如下，以供有意養鹿的農友參考。

鹿舍建築要堅固

鹿喜陰涼，因此一般都飼於較通風和乾燥涼爽的山區或郊區山麓或坡地。若平地飼養，鹿舍最好建於較隱蔽安寧且涼爽之處。

美國默克大藥廠出品



霉敵340

MERTECT
系統性殺菌劑



防治：洋菇褐痘病

優點：

1. 經濟部最新推荐，安全可靠。
2. 對洋菇無藥害，不會延期出菇。
3. 可刺激洋菇生長，增加產量。

防治：柑桔儲藏期病害

優點：

1. 延長儲藏時間。
2. 調節市場需要提高售價。
3. 減少腐損，增加收益。

台灣總代理：美商新美公司

台北市八德路三段20號 台資大樓八樓
電話：7719163~6 (四線)

鹿舍建築要堅固，因為鹿尚未完全馴化，野性仍存，較難控制，因此一般均不使用門鼻、繫繩，更不敢放牧。尤其雄鹿體壯力強，應慎防其破壞力，應以圍欄為宜。

鹿圈飼於鹿舍，圍欄所使用的材料可利用木柱或鋼筋。每頭成鹿平均需要面積約一·二坪，按此面積以木柱隔間，圍欄高度約二·五公尺，木柱間隔約二十公分（依鹿體型大小而調節）。舍外宜設運動場地，供鹿日常活動和公鹿發茸、母鹿配種之需。

運動場可利用大號鐵絲網圍成圍欄，高度約三·五公尺。平時公母鹿分開飼養，公鹿每間一頭約二·五×五公尺。

母鹿在懷孕期間與哺乳期也應單獨一間，其他時期可三、五隻合飼。圍欄應注意通風良好、光線充足和堅固耐用。

舍頂可利用瓦片或茅草，只須隔熱良好即可。運動場不須搭棚蓋。水鹿性喜水，在露天運動場可設置水池，夏天溫度太高需設沖涼水龍頭。鹿舍地面以水泥地為佳，表面要粗糙，整個地面要有小角度的傾斜，一般以不鋪墊草為佳，否則糞尿淤積不易清除。

鹿舍附近種牧草

鹿原來野生於中央山脈，攝食青草和柏、榲、槲、栗等的芽葉、樹皮。

現今人工圈飼，經餵食而証實品質優良者有：狼尾草（奈比亞草）、盤固草及其他豆科與禾本科的牧草，優良的農產副產品如甘蔗梢、青割玉米、甘薯蔓、甘薯莖、豆腐渣、鳳梨渣、麸皮、脫脂米糠、麥粕、胡蘿蔔、生甘薯、果實、香蕉莖葉等可依季節和各地市價自行選擇。


最好在鹿舍附近種植牧草。牧草種類很多，目前應用最多的牧草為狼尾草。在有灌溉的牧地，如果定時施肥，產量特高，每二十餘日可四十餘日刈一次。每年每甲牧地可青割三百至四百噸，足供三十隻成鹿青料之需。

每日供應青飼料

最好每日均有青料的供應，至少纖維質要占所有飼料的一半。日間給飼三次，夜間則放置適量的青飼料供任食，並全日供水。母鹿在懷孕期間需另外補充豆餅、豆科牧草與精料，在懷孕末期應多給麸皮等輕瀉性飼料，以防生產前的便秘。

公鹿在配種期與發茸期間應補充蛋白質飼料。食塩可置於舍內供鹿自由取食或直接加少量於食水中，尤其青草吃得愈多應加稍多量的食塩。二、三歲以上的鹿每天需要約二十台斤青草。總之，鹿的食量較牛為小，且凡牛能吃的草料，鹿都可飼餵。

（未完·下期續）




——（薛聰賢）——

日本岡恒牌高級園藝工具

鋼質最優秀！設計最實用！


其他：大型鋏、枇杷鋏、高枝切鋏、刈込鋏、洋葱鋏。



請注意！岡恒牌舊型剪定鋏刀及銜夾銅線者均為假製品

日本東海牌高性能引擎刈草機

機種 NEO ACE 101 1.5馬力
TOKAI K-15 1.5馬力
K-18 1.8馬力



男女婦孺均能容易操作，工作效率甚高。

◀原裝進口，歡迎選購▶

經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190·3713208 郵檢台北市15195號