



鹿的飼養管理

廖貴燈

(續上期)

專人管理。清掃鹿舍

- ①鹿舍平日需有固定專人管理。
- ②鹿舍須每日動加清掃，以免招來蚊蚋、霉氣、蛛網、虫蟻等。食槽定時洗刷，清水每日更換。若有墊草也應適時更換，保持鹿舍的乾燥衛生。
- ③應經常巡視鹿舍是否清潔、安全。鹿要設置個別的日常生活紀錄卡，以便明了鹿的健康及生理情況。

④鹿隻正常健康情況為：食後反芻，鼻鏡濕潤，精神飽滿，行動敏捷。若發現鼻鏡乾燥，精神萎靡，採食量減少，即應注意。

⑤鹿舍地面太滑，會使鹿隻摔傷腳骨而跛腳，應及早治療，並改進場所的缺點。

⑥飼料應防止發霉飼料的堆存；給食的青料是否混雜有毒植物（如夾竹桃），青料是否剛噴過農

藥，是否沾有污物等均應特別注意。

⑦鹿對疾病的抵抗力很強，因此在日常管理中，很少碰到棘手的疾病。常見的有消化不良、下痢症，如發現有這些症狀，則甘薯、玉米葉等應停止供應，另在給水時多加些塩分，自會痊癒。

⑧在農業要覽（獸醫）中有片斷記載，如牛瘟、口蹄疫亦能使鹿感染，但可能僅為人工感染，而沒有自然感染的病例。

⑨大規模飼養時，為識別方便起見，在小鹿斷奶後二周，即行打耳號或烙印編號。

⑩為避免疾病的傳染，其他家畜如牛、羊、豬等畜舍，最好不要和鹿舍太過於靠近。

適期配種・注意管理

①成熟期

雄鹿出生後滿二十個月即有配種能力，雌鹿在十二~十四個月大多數均可發情，少數稍延後至二十個月才發情，因此不論雌雄到滿二歲時即有發情交配繁殖的能力。雌鹿在第三年初產。雌鹿供做種鹿者不宜過早配種，應待完全發育成熟後（約三歲）配種為佳。

②交配期

本省飼養鹿隻，多在每年的秋季九~十一月即立秋至冬至，為其發情交配期。鹿為單發情動物，如在發情交配期內不受精，即須等到翌秋。水鹿的發情周期為二十天，發情持續一~二天，在此期間將種公鹿驅入母鹿欄內，使其自然交配。母鹿發情時，陰部紅腫，尾部揚起，但多數母鹿的發情徵兆不太明顯，但可在此交配期內將公母鹿合飼，以公鹿來試情，觀察雌鹿追逐的目標即可知何隻母鹿發情。

鹿類野性仍存，急躁而好自由，因此尚選無法行人工授精。鹿在交配時不願被人或其他動物窺見，喜歡在黃昏僻靜的時候始行交配，因此管理者在

配種期應特別注意，勿使其好事受驚擾。

③懷孕期

水鹿的懷孕期為二六〇~二七〇天，梅花鹿約為八個月。在懷孕期間，母鹿應多運動，因此運動場地不可缺少，以防範胎兒過大，母鹿過肥，否則母鹿有難產的可能。母鹿在懷孕後半期，應單獨隔飼，補充精料並增加鈣皮用量，以防便秘。

在分娩前三天，母鹿的兩個乳房膨脹顯露，乳頭淡紅色，充滿初乳。尾根兩側的胎兒下降至腰間。若見母鹿神情不安，而且不停繞欄走動，陰部紅腫或有銜草做窩的情形，約在二十四小時之內必將分娩。

④分娩期

在分娩期，把產房稍加清掃，但應避免驚動母鹿，然後鋪上清潔柔軟的乾墊草。分娩時，管理者應在旁邊，不可驚擾牠。正常情況，分娩時羊水破後十五~二十分鐘，胎鹿前腳先出，頭與身隨即出現，前後約半小時至一小時即可順利產下仔鹿。母鹿的難產率高達二〇%，因此在分娩時應特別注意隨時準備給予協助。產下仔鹿後，胎衣在數小時之內能自然排出，應速將此胎衣取走埋掉，以免被母鹿採食。

⑤哺乳期

仔鹿產下之後，立刻以乾布將仔鹿口鼻的粘膜清除，以防窒息（多數母鹿也會舔去仔鹿的口鼻粘膜），剪去過長的臍帶，並以碘酒消毒。正常情況下，仔鹿在生下一~二小時內即能站立吸乳。若體弱不能站立吸乳時，則管理者應予以協助授乳。初乳含有輕瀉胎便之作用，並含有免疫抗體增強仔鹿的抗病力，因此無論如何，應使仔鹿吸食初乳，以維持正常的發育。

哺乳期間，母鹿應有充足的營養。草料之外，適量供給蛋白質豐富的精料，母鹿才不致因產仔鹿哺乳而骨瘦如柴，影響生育年限。

幼鹿哺乳二~三個月即可斷乳。斷乳前三周可逐漸給予較嫩的青草，至仔鹿完全能利用青草、飼料後才把母鹿仔鹿隔開。在哺乳期間，少數母鹿有舔小鹿癖，須防範，以免小鹿皮破血流。（完）