

又可作為防風用之生垣。葉遇猛火即變黑色，火焰不燃，亦適於在建築物四周栽植作為防火用。

此樹耐陰性強，在其他生長不良的樹木下栽植，可以保持綠意，美化環境。在現時綠化環境和都市庭園中，亟需要具備此等特性的樹種。除供觀賞風緻之外，尚可作防風、防潮、防火、隔音、防塵等多種用途。

以插條繁殖，極易成活。於六月間切取枝條二三節，修剪葉之一半，予以扦插，容易成活。


植株成長以後，每年要施行修枝，以使樹叢逐年增高，否則下部枝葉稀疏，會產生空隙，實不相宜。

本屬中其他觀賞樹木，尚有下列多種——

胡蝶樹 (*V. tomentosum*)：落葉灌木，聚繖花序，多數花聚生為一團花球。其樹形及花的性狀，極適合於西洋式庭園布置之用。美國人稱為雪球 snowball，甚受喜愛。以插條繁殖。

產我國及日本的，有多數變種。果實橢圓形，熟時紅色，後變藍黑色。

南歐繡球花 (*V. tinus*)：常綠灌木，自地際



黃槐

發生多數分枝。花序在新梢頂生，蕾帶紅色，開花為白色，花冠裂片卵形平開，果實卵形，成熟時為藍色。

花期在三、四月間。產地中海沿岸、英國及美國西部地方，用作綠籬或庭園樹栽植甚為普遍，觀花觀果皆宜。如以播種或插木繁殖，自然放任栽植，其樹形發育甚佳。

天目瓊花 (*V. sargentii*)：落葉灌木，花序繖形狀，在新梢頂生。花黃白色，果球形，橙紅色。入秋葉色變紅。

葉、花、果具美，樹性強健。原產我國、日本各地，栽植亦多。

紅子仔 (*V. formosanum*)：紅子仔產本省各地山麓，比較普遍。熟果枝，綠葉紅果，美麗可愛，移植庭園觀賞，或採着果枝作為插花材料，均很適宜。

落葉小灌木，葉菱狀闊卵形，淺銳鋸齒緣。聚繖花序密花，頂生，花冠鐘狀。核果球形，熟時紅色。

着生珊瑚樹 (*V. arboricolum*)：本省中南

黃槐 適宜庭園栽植

邵淑平

黃槐學名為 *Cassia glauca*

Lam.，屬於蘇木科。原產熱帶亞細亞，常綠灌木，樹勢生長旺盛，樹高約二、三尺。

黃槐枝條中空，早開展式向四方生長，新枝青綠色，圓滑，老枝粗糙黑褐色，葉青綠色，羽狀大卵形複葉，輪生，葉背淡綠色有細小斑點。

花梗從先端數節之葉柄基部抽出，花柄長約二公分，花五瓣，金黃色。雄蕊長而彎曲，繖形

色，燦爛奪目，非常艷麗。果實極似四季豆，為莢果，垂吊樹枝，迎風搖曳，別有一番情趣，最適合花盆及庭園中栽植，本省栽培很廣。

黃槐性喜排水良好，稍黏之黏質壤土為佳。種植時需擇通風，陽光充足之地，否則發育不良，不易開花。

繁殖方法一般用播種及扦插。播種之種子，應於花期過後（即十一月底以後）果莢乾扁稍裂

核果橢圓形。

部山地森林內固有樹種。着生常綠灌木，聚繖花序成圓錐形排列，花冠鐘形。核果橢圓形，熟時紅色，後變黑褐色。

玉山糯米樹 (*V. foetidum* var. *integrifolium*)：常綠小灌木，亦為本省固有樹種，產中央山脈潤葉林內。聚繖花序成圓錐形，花冠白色，核果橢圓形。



紅果金葉蘭

花序。花期為九月下旬至十一月底，開花時整株一片金黃

時採收，陰乾後儲藏。插穗宜選充實枝條基部中空小之部位，剪取長約一五公分。

於春季二、四月，將地整鬆，拔除雜草，或將花盆鬆軟土壤供扦插或播種，注意灌水保持土壤濕潤。四、五月俟苗高一尺許即可移植。

移植前，先將庭園種植之處或植盆中，放置腐熟基肥與土壤攪拌，然後將苗挖出，並將枝條剪短，種植盆中或庭園中，暫放蔭涼處或加遮蔭。每天要洒水，待芽吐出，即無需遮蔭，將苗木放置陽光充足處，當年十月即可供觀賞。黃槐生性強健，無病虫害發生，最為一般人士所寵愛。