

松鼠和猴子

· 黎明 ·

松鼠安安和猴子驕驕一起住在一座靠近農場的森林裏，生活得很愉快。白天，牠們在陽光下嬉戲，肚子餓了，就在枝葉蔥鬱的樹林裏覓食。晚間，牠們可以安安穩穩的躲在大石下或樹洞裏睡大覺，做美夢，一切無憂無慮。

可是，有一天，驕驕摸摸自己的大腦袋，有着無限的感慨，說：

「啊！這算什麼呢？像我這樣聰明的猴子，一天到晚，餓了只吃一些味道苦澀的野果，渴了，又要伏在山澗裏喝那清淡無味的泉水，這多乏味，多寒酸呀！難道我就這樣平凡的度過我的一生嗎？不，絕不，我一定要到農場去碰碰運氣。」

說着，說着，驕驕終於不顧安


安的反對，開始動身到農場去了。

「喂！驕驕，請聽我的勸告！農場裏美味可口的果子和豐滿結實的玉米固然可口味美，但那是別人勞力的結晶啊！你怎麼可偷竊別人



猴子驕驕說：「我一定要到農場去碰碰運氣。」

信譽的標誌




圓方牌農藥

消除雜草，怎樣選擇除草劑？請用雜草之大剋星：



巴拉刈

唯有本公司出品，才是真正優良之產品！

請認明
標籤與鋅鉑封口上印有“”
之榮譽標誌，才是真正巴拉刈

允發農化工廠有限公司 台北市萬大路225號
TEL. 3316549-3710288

人工作的成果呢？」

安安嘮叨了大半天，可是驕驕聽了却毫不在意，竟然大搖大擺的癡笑着，連頭也不回的走了。

「哼！你這愚昧無知的可憐蟲，永遠不知道去享受生命的賜予！泥做的腦筋，哈哈，真是傻瓜蛋一個！」驕驕一路上默默地譏笑着，安安，她自己却很得意。

「喂！伙計們，請注意，我們農場裏最近出現了盜賊，因為我每天到農場裏去巡視，總發現水果和玉米都在短少，我們一定要齊心合力，把這可惡的盜賊兒捕住，好好的教訓他！」有一天，楊監工忽然集合農場裏的全體工人，大聲疾呼說。

這時候，安安很悠閒的躺在一株老樹下的大洞裏，嚼着自己平時辛苦儲蓄下來的野果。疲倦了，就蜷伏在柔軟的乾草裏，不斷的甜睡，做着那奇怪又美麗的夢。


不知道經過了多長的時間，忽然從遠處傳來了一陣陣叫呼聲和響徹山林的喊打聲、喧鬧聲。安安突然從甜夢中驚醒。牠睜開了惺忪的兩眼，疾跑出了洞口，慌忙向前奔跑，並向遠處眺望，牠一心一意想知道外面到底發生了什麼事情。

結果，安安給嚇住了。當牠看到了那種不堪設想的場面以後，牠不知道怎麼辦才好？現在，安安只知道瞪圓了眼睛，凝視着牠那個醉心於不勞而獲的朋友驕驕。牠又看到驕驕被迫穿着一件綠色的、花邊



樂敏牌

ROBIN



EY18-3B

農業、產業機械之動力源

二衝程·四衝程

一馬力至二十馬力各馬力齊全

●強力 ●輕便 ●省油 ●耐用

製造元：富士重工業株式會社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓

TEL. 3610740·3612045·3613541~3

的長袖子短衣，背下露出了一个羞紅了的屁股，戰戰兢兢的在楊盤工的鞭子威脅下，不斷地揮舞着假刀，翻着好笑的筋斗，博取孩子們的歡笑。有一些頑皮的大孩子，不住地向驕驕投擲一些光禿禿的玉米棒子，花花疤痕的空壳，譏諷着：「饞嘴的賊，偷東西的流氓、……」

「啊！依賴着別人收穫而享樂的傢伙，總有一天，會變成別人享樂的對象哪！」安安不忍心再下去了，牠長嘆了一口氣以後，竟默默地回到樹林裏去了。



牧草螞蝗防治

〔問〕：(一)我有山坡地數公頃，將闢為牧場養牛或肉毛兩用兔。但此地種植的牧草，常寄生螞蝗，如何撲滅及防治？

(二)建牛舍應注意什麼？(中和鄉連城路一一七巷三一號二樓繆文誠)

〔答〕：(一)普通螞蝗都喜歡寄生在比較濕的草地，所以如何土地太濕，種植一般牧草或是放牧，都需要慎重考慮。

太濕地亦不能生長較好的牧草，只能生長一些爬拉草或狼尾草。

驅除螞蝗最好的方法是：
 (1)乾燥(2)用石灰粉散布。
 螞蝗會爬入牛的鼻孔內寄生，最嚴重的會爬到鼻腔的上端，對牛非常不利。
 (三)太濕的地，不宜建造牛舍。

普通牛舍不用好材料，只用一個棚子即可。
 牛舍內面用水泥紅磚做飼料槽，地面以水泥地最好，否則牛一多會成很深的泥漿，加上牛糞尿，使牛及人無法進入。
 牛舍大小依你養的牛有多少而定，沒有一定規定。

(三)建造兔舍，普通在能防風雨的房子內，用鐵絲網或木材做兔籠，便利管理就可以。
 兔籠的構造，最要緊的是防老鼠侵入，以免生的小兔全被老鼠吃光。所以用鐵絲網作兔籠最宜。
 普通一頭兔的面積約為二×一·五尺即可，大型的肉兔則須加大。(黃立羣)

豐年叢書

台灣的野生蘭

修訂再版

平裝本：定價128元·含掛號郵資

精裝本：國外定價一律75美元·含海運郵資

國內特價160元·含掛號郵資

豐年社

台北市伊通街一〇六巷二七號
 郵政畫撥五九三〇號 豐年社

龍眼移植

〔問〕：(一)龍眼枝條上附有紅膠物，這是何病虫害？如何防治？

(二)我在今年六月間移植龍眼樹(約三、四年生)，因正逢雨季，每棵都發芽，但到八月底有些就枯死了，這是何因？

(三)在灌水不便之處，龍眼的適當移植期在何時？

(四)龍眼結實往往有隔年現象，如能適時施肥是否可避免？

(五)龍眼施肥要領如何？(斗六鎮平和街六一號黃景彬)

〔答〕：(一)龍眼枝條上的紅褐色膠狀附着物是「膠虫」，為介殼虫的一種。幼虫呈白色時，尚未起膠，可噴「巴拉松」或「大滅速」防治。起膠後則施藥無效，只好將受害枝條剪下燒毀。

(二)夏季是植物生長最旺盛的時期，不宜移植。但盆栽植物，取出時不會傷害根系的，則可移植。
 移植後，如受傷根部無法很快恢復，就會枯死。

(三)任何植物移植適期是在休眠期或最寒冷時。在乾燥、無法灌水之地，最好在休眠時期先行種入盆中或塑膠袋中，再於雨季時，自盆中或塑膠袋中取出，種植於園地，則可免枯死。

(四)隔年結果為遺傳性，與果樹種類有關，龍眼本非隔年結果樹種。結果多少是受營養的影響，可用施肥管理方法，予以糾正。

近年來有部分果農在果實未採收前的八月間(陽曆)，施用化學肥料，使採收後得以盡速抽生新梢，入冬獲得休眠，翌春即可順利開花結果，已無結果大小年現象。

(五)龍眼施肥的時期為三、六、八月。八月的施肥目的是在調節抽梢，此與次年的開花結果有密切關係，非常重要。

三要素的配合為：硫酸銨：過磷酸鈣：硫酸鉀=1：0·8：0·四二。(張振宙)

