

的長袖子短衣，背下露出了一个羞紅了的屁股，戰戰兢兢的在楊盤工的鞭子威脅下，不斷地揮舞着假刀，翻着好笑的筋斗，博取孩子們的歡笑。有一些頑皮的大孩子，不住地向驕驕投擲一些光禿禿的玉米棒子，花花疤痕的空壳，譏諷着：「饞嘴的賊，偷東西的流氓、……」

「啊！依賴着別人收穫而享樂的傢伙，總有一天，會變成別人享樂的對象哪！」安安不忍心再下去了，牠長嘆了一口氣以後，竟默默地回到樹林裏去了。



# 農業信箱

## 牧草螞蝗防治

〔問〕：(一)我有山坡地數公頃，將闢為牧場養牛或肉毛兩用兔。但此地種植的牧草，常寄生螞蝗，如何撲滅及防治？

(二)建牛舍應注意什麼？(中和鄉連城路一一七巷三一號二樓繆文誠)

〔答〕：(一)普通螞蝗都喜歡寄生在比較濕的草地，所以如何土地太濕，種植一般牧草或是放牧，都需要慎重考慮。

太濕地亦不能生長較好的牧草，只能生長一些爬拉草或狼尾草。

驅除螞蝗最好的方法是：  
 (1)乾燥(2)用石灰粉散布。  
 螞蝗會爬入牛的鼻孔內寄生，最嚴重的會爬到鼻腔的上端，對牛非常不利。  
 (三)太濕的地，不宜建造牛舍。

普通牛舍不用好材料，只用一個棚子即可。  
 牛舍內面用水泥紅磚做飼料槽，地面以水泥地最好，否則牛一多會成很深的泥漿，加上牛糞尿，使牛及人無法進入。  
 牛舍大小依你養的牛有多少而定，沒有一定規定。

(三)建造兔舍，普通在能防風雨的房子內，用鐵絲網或木材做兔籠，便利管理就可以。  
 兔籠的構造，最要緊的是防老鼠侵入，以免生的小兔全被老鼠吃光。所以用鐵絲網作兔籠最宜。  
 普通一頭兔的面積約為二×一·五尺即可，大型的肉兔則須加大。(黃立羣)

## 豐年叢書

# 台灣的野生蘭

修訂再版

平裝本：定價128元·含掛號郵資  
 精裝本：國外定價一律75美元·含海運郵資  
 國內特價160元·含掛號郵資

## 豐年社

台北市伊通街一〇六巷二七號  
 郵政畫撥五九三〇號 豐年社

## 龍眼移植

〔問〕：(一)龍眼枝條上附有紅膠物，這是何病虫害？如何防治？

(二)我在今年六月間移植龍眼樹(約三、四年生)，因正逢雨季，每棵都發芽，但到八月底有些就枯死了，這是何因？

(三)在灌水不便之處，龍眼的適當移植期在何時？

(四)龍眼結實往往有隔年現象，如能適時施肥是否可避免？

(五)龍眼施肥要領如何？(斗六鎮平和街六一號黃景彬)

〔答〕：(一)龍眼枝條上的紅褐色膠狀附着物是「膠虫」，為介殼虫的一種。幼虫呈白色時，尚未起膠，可噴「巴拉松」或「大滅速」防治。起膠後則施藥無效，只好將受害枝條剪下燒毀。

(二)夏季是植物生長最旺盛的時期，不宜移植。但盆栽植物，取出時不會傷害根系的，則可移植。  
 移植後，如受傷根部無法很快恢復，就會枯死。

(三)任何植物移植適期是在休眠期或最寒冷時。在乾燥、無法灌水之地，最好在休眠時期先行種入盆中或塑膠袋中，再於雨季時，自盆中或塑膠袋中取出，種植於園地，則可免枯死。

(四)隔年結果為遺傳性，與果樹種類有關，龍眼本非隔年結果樹種。結果多少是受營養的影響，可用施肥管理方法，予以糾正。

近年來有部分果農在果實未採收前的八月間(陽曆)，施用化學肥料，使採收後得以盡速抽生新梢，入冬獲得休眠，翌春即可順利開花結果，已無結果大小年現象。

(五)龍眼施肥的時期為三、六、八月。八月的施肥目的是在調節抽梢，此與次年的開花結果有密切關係，非常重要。

三要素的配合為：硫酸銨：過磷酸鈣：硫酸鉀 1：1：1  
 〇〇〇：〇〇〇：〇〇〇  
 二。(張振甫)



## 芝麻用途

〔問〕：(一)芝麻有什麼用途？適合種在何處？

(二)有專門收購的工廠嗎？

(三)芝麻收穫量如何？

〔答〕：(一)芝麻除可抽取油外，亦可作油餅或滲在飯吃。

(二)芝麻除可抽取油外，亦可作油餅或滲在飯吃。

(三)芝麻除可抽取油外，亦可作油餅或滲在飯吃。

芝麻油除可做食用油外，醫用等用途也很廣。油餅可做飼料用。

芝麻可在排水良好的普通田間種植。最好種在沙壤土或壤土。

(二)沒有專門收購的工廠，北港、朴子、台南一些油廠(較小型的)或普通雜谷商可能會收購。

(三)每公頃收穫量為七〇〇~一、〇〇〇公斤左右。

芝麻普通都種在非灌溉地，所以收量不高。

如在普通良田種植，每公頃可收一、二〇〇公斤以上。

(四)芝麻很容易種植而粗放。普通三、四月播種，每公頃需種子六公斤，種子可在收穫期(七月)購買後，儲存在翌年春天再播種，或播種時向雜谷商或種子行購買(可能岡山方面就有)。(陳春齡)

## 乾燥花製法

〔問〕：(一)土木香、大理菊及菊芋三者有何互相關係？

(二)如何栽培？

(三)經濟上有利利用價值？

(四)目前本省栽植情形如何？

(五)乾燥花如何製作？(台中縣大甲鎮中山路一段七八一巷四八號紀本源)

〔答〕：(一)土木香、大理菊、菊芋都是菊科植物。

(二)土木香為多年生草本，一般用種子或分株繁殖。喜表土深厚的沙質壤土。

三月定植，注意中耕、除草，五月以後施化學肥料、雞糞等追肥。夏天在畦面敷草，秋季可收穫。

大理菊多採分球、扦插、嫁接等繁殖法。

土質以微酸性的沙質土為宜，肥料分基肥及二次追肥施用，並應行摘蕊工作。

菊芋繁殖以種薯為佳，亦可播種。喜富含腐植質的肥沃粘土，生育中為防風宜立支柱，施行中耕、除草數次，發生花蕾時宜摘除，至莖葉枯後才採收。

(三)土木香可布置花壇，嫩葉可食用。二、三年生的根乾燥後，搗說可健胃、去痰、利尿，對氣管炎、消化不良有效。

大理菊以觀賞、切花為主。菊芋的地下莖可煮食、醃食，並可充家畜飼料。

(四)目前本省栽培大理菊較普遍，土木香、菊芋較少人栽培。

(五)製作乾燥花，有風乾及乾燥劑乾燥二法。

風乾法是將花莖綁在一起，倒置於黑暗、乾燥、通風處即可。

使用乾燥劑(如氯化鈣、沙土膠等)法是在一容器內將花朵埋於乾燥劑中，置陰暗、乾燥處一、二星期即可。(陳惠美)

# 強力白粉克乳劑 37.4%

## 讚就是讚!!

用過的人都這麼說



新包裝100c.c.×60支紙盒裝

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、荷蓮豆、蔬菜等一般果樹白粉病特效藥、敬請愛用本劑

### 黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓

電話：(02) 3816895

現貨供應：山本農藥行 屏東市復興南路100~5號 TEL.24401