

# 蔭棚寵物：木玫瑰

聰賢

木玫瑰並不是玫瑰，成熟的蒴果成木質花，形狀很像玫瑰，因此得名。

木玫瑰這類植物，栽培容易，蔓性特強，生長旺盛，在一般家庭做為美化環境，攀緣籬笆，或做蔭棚材料，頗受人們喜愛。

這種原產錫蘭的普通木玫瑰 (*Oreocarya tuberosa* L.)

，葉掌狀，由五、七小葉片組成，花黃色，形似牽牛花，花朵呈漏斗狀，極為美觀高雅。據筆者栽培經驗所得，平常都在早晨開花，如在晴天之下，花於中午以前即行凋謝，如逢陰天，花朵盛開可維持至日落。有時落花後可能再開花，花期甚長，可達三個月左右，花瓣始行掉落。

此時蒴果漸漸長大，蒴果米成熟前呈淡綠色，形狀如同倒轉陀螺 (也極像蛋黃果)，奇特雅緻。成熟後，果莢開裂成木質花，呈棕色。

木玫瑰是蔓性植物，蔓性特強，在二十四小時內，可伸長十二英寸。新梢蔓性莖，含有大量乳液

，攀緣性比一般蔓性植物為快。據筆者栽培，從播種六個月後，最長蔓性莖約八公尺，其攀緣範圍約有三公尺見方。因此，此類植物是做為蔭棚的最佳材料。

在本省栽培木玫瑰，大多數做為蔭棚觀賞之用。但在美國夏威夷洲一帶，栽培木玫瑰的主要目的，却是為採集乾蒴果。他們將成熟的蒴果，雕製加工成各種飾物，深受商業市場消費者歡迎。

木玫瑰的栽培方法，與一般蔓性植物無異，對於土壤選擇並不苛求，只要排水良好，日照充足的環境下，即能生長良好。

施肥方面，先做好基肥處理 (可用腐熟雞糞或木屑)。苗木定植後，待發新梢時，略施以三要素，約每年三次即可。

由於木玫瑰是蔓性植物，因此必須搭蓋棚架設備，或設立支柱，以利生長攀緣。

木玫瑰的繁殖方法，大多採用實生法。採用強壯蔓莖所生的成熟蒴果，從蒴果中取出種子，用水浸漬一日或用小刀在種子表面切一小缺口，然後將種子埋入沙壤裡，深度約為三、五公分 (種於塑膠袋或素燒盆亦可)，十五天左右即可發芽。待苗高約一公尺左右移植。


木玫瑰的病蟲害，甚為嚴重。如一般毛虫、甲虫、紅蜘蛛、黴菌，經常為害木玫瑰葉片，須按農藥說明噴施殺虫劑。如發生病蟲害範圍不大，亦可摘除其葉片，並不影響生長發育。當木玫瑰的蒴果尚未開裂而漸漸成白色時，就是可以採收的特徵。

成熟的蒴果採收後，須置於通風良好的屋內，用繩索或鐵絲設架，把蒴果懸掛其上，以促進水分蒸發，而後果莢漸次開裂。

果莢開裂之後，可用噴霧器噴以假漆或塗料，增加木質化的光澤，並可經久儲藏。木玫瑰的品種，除了本文介紹的普通木玫瑰外，尚有原產印度小花種木玫瑰，及原產於波利尼西亞的木玫瑰，這兩種木玫瑰，本省栽培甚少。



生長旺盛的木玫瑰



木玫瑰的蒴果