

室內植物常見病象

余妙玲

受病蟲為害的室內植物，如果能及早明了病因，就可以很快地起死回生。有時，一個普通的病象，實際上，可能是由許多原因造成的。下面是幾個常見的病象及可能的病因，提出供大家參考——

葉子轉黃：原因是澆水過多，以致土壤濕度過高，植株難於適應，所以盆底一定要有一個排水孔。

其他可能致葉子變黃的原因還有：土質缺氮肥、陽光過多或過少、缺乏新鮮空氣等。如葉柄基部變黃，則表示葉子

已衰老，必須剪除。

葉子脫落：葉子脫落可能是因為室內煤氣漏氣，但情形輕微，所以只有植物受害。此外，當植物自陽光充足的地方移到陰暗的地方，由陰暗的地方，移置陽光下，或澆以太冷的水，或溫度太低，都會導致

葉子脫落。

黑斑：植物暴露得太冷或太熱的空氣中時，葉片容易變黑。營養不良或陽光不足也易導致黑斑的發生。另一個常見的原因是植物受到蚜蟲、蝸牛、紅蜘蛛的為害。

花苞脫落：室內溫度的變化大，有時太熱，有時太冷，都會引起植物花苞的脫落。植物最好不要放在通風口，而且不要經常移動位置。

如每天耐心地按時照料，即能改善上述大部分的病象。如果枝葉枯死萎謝，就要立刻剪除。每星期至少需要一次以水噴灑葉面。如果病象仍未消失，就是有其其他的病因。



圖蘭九條龍 (朱義朝)

黃金椰子簡易繁殖法

店、賓館、客廳……等地方，均布置有此種盆栽。為觀賞植物中極為普遍，且容易照顧者。育苗大都用實生繁殖

黃金椰子在本省大都栽培於庭園四周，或做為行道樹綠籬種植，也有做為盆栽觀賞者。

在花壇的設計栽培上，也常被利用在顯著的部分，不只襯托出整個花壇的美觀，甚至增加了整個花壇的真善美感。

在某些公共場所，重要建築設施的門口兩旁、大飯店、賓館、客廳……等地方，均布置有此種盆栽。為觀賞植物中極為普遍，且容易照顧者。

但是有一點須特別注意的，就是地上莖的分株須已長出根者，分株栽植後才易於成活。沒有根的須等到長出根後再行之。

(郭瑞祥)



適於分株繁殖的黃金椰子幼株