

口服避孕藥最有效！

口服避孕藥是一種由類似女性荷爾蒙製成的藥片，婦女服用後可以控制排卵，達到避孕的目的。

這種藥片目前正廣泛地為世界各地婦女所採用，其服用方法很簡單，只要每天按時服用一片，就有百分之百的避孕效果。這種女性避孕方法尤其適合於新婚婦女。

(一) 口服避孕藥的種類及服用方法：

口服避孕藥有二十一粒裝及二十八粒兩種，服用方法稍有不同：

(1) 二十一粒裝口服避孕藥的用法：

開始服藥是月經來潮的第五天吃下第一粒，以後每日一粒。服完二十一粒，停七天。接着服第二月分，以後繼續照此服用。

(2) 二十八粒口服避孕藥的用法：

開始服藥亦於月經來潮的第五天，吃下第一粒白色藥片，以後每日一粒。

服完二十一粒白色藥片後，接着服用紅色藥片，每日一粒，直至七粒紅色藥片都服完後，緊接着服用第二月分，也是從白色藥片開始服用，中間不用停止，以後繼續照此服用。

二十八粒裝藥片，實際上與二十一粒裝相同，只是它除了含

有二十一粒白色避孕藥片外，另有七粒紅色鐵劑藥片，這七粒紅色藥片只有補血作用，沒有避孕效果。

(二) 忘記服用時：

忘記服用口服避孕藥多日即容易懷孕。如忘記服用一粒，則第二天多服一粒即可，但忘記服用二粒以上，必需停止服用，直至月經來潮的第五天再開始服用另一月分的藥，而在停服期間必需採用一般方法避孕。

(三) 口服避孕藥的副作用問題：

(1) 婦女服用口服避孕藥會同懷孕初期一樣，服藥初期會有噁心、嘔吐、頭暈、易疲倦等現象，但為時不久就會消失。為減輕這些現象，最好於每天晚上睡前服用。

(2) 服用口服避孕藥會影響以後的生育能力嗎？

據專家的研究所得，凡服用口服避孕藥的婦女，於停止用藥後，其生育力不受影響。

停服的人一月內受胎的有六十一%，三個月內受胎率高達九二%。

(3) 哺乳婦

服用口服避孕藥對嬰兒有影響嗎？

哺乳婦服用口服避孕藥對嬰兒並沒有不良的影響，但因它可能會抑制乳腺的分泌，因此乳水不足的哺乳婦最好不服用。

(4) 服用口服避孕藥會引起子宮癌或其他疾病嗎？

至目前為止，還未有因服用口服避孕藥而引起癌症或其他疾病的患例產生。

(5) 得過那些疾病的婦女不能服用口服避孕藥？

凡患過下列疾病的婦女，不宜服用口服避孕藥：

- ① 血栓性靜脈炎或靜脈瘤。
- ② 心臟病。
- ③ 腦血管障礙如高血壓、動脈硬化症。
- ④ 網膜乳頭、浮腫、網膜動脈血栓症、乳球眼神經炎。

(四) 服務場所：

各地衛生所及省立醫院婦產科家庭計畫門診部都有供應，只要攜帶太大的身分證及印章，就可得到工作人員的指導。




合給弄孫(呂福吉)

日本岡恒牌高級園藝工具

鋼質最優秀！設計最實用！


其他：大型鋏、葡萄鋏、高枝切鋏、刈込鋏、洋蔥鋏。



請注意！岡恒牌舊型剪定鋏刀及銜夾銅線者均為假製品

日本東海牌高性能引擎刈草機

機種 NEO ACE 101 1.5馬力
TOKAI K-15 1.5馬力
K-18 1.8馬力



リコイルスタータ付

男女孺均能容易操作，工作効率甚高。

◻ 原裝進口，歡迎選購 ◻

經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190 · 3713208 郵檢台北市15195號