

農業信箱



農藥藥效

〔問〕：（一）短期蔬菜（

葉菜類）使用加保扶粒劑後

，須經幾天才可摘食？

（二）農藥有效成分的高低

（例如五〇%與二〇%），

殺虫效果相同嗎？

紅甘蔗蟲害

〔問〕：（一）紅甘蔗蟲害應該如何防治？

〔答〕：（一）蔗園主要管理工作是那些？（

南投水里鄉民和村忠信巷四一二二號林其文）

〔答〕：（一）紅甘蔗的蟲害防治：

（1）螟蟲：應割除枯心，以殺死莖中幼虫為原則。防治白螟蟲，可刮除葉背卵塊，置於袋中燒毀。

（2）二期綿仔甘蔗的紫螟蟲，亦可配

合水稻螟蟲防治，噴施「一品松」（

E.P.N.）或「撲滅松」（Sumithion）來防治。

（3）金針虫、白蟻、蔗龜、鋸天牛等可施用「飛布達」（Heptachlor）

粉劑，每公頃四五九〇公斤，於種植前翻入植溝二五公分深土中，再種蔗。

（4）紅甘蔗種植後至收穫前的蔗園管理工作，有補植、中耕、除草、施肥、入土、培土、灌溉、排水、剝葉、病虫、鼠害防治、盜損防止等。（

林宗然）

羊角草）在水稻生育中，可使用那一類殺草劑？

〔問〕：（一）「大生M四五」噴於水稻有什麼作用？

〔答〕：（一）水稻開花期可否噴微量元素，對受粉率有無影響？

（桃園縣平鎮鄉東勢村金雞湖三一號曾盛溢）

〔答〕：（一）加保扶粒劑是滲透性農藥，因此在使用後需經二十一天才可採收。

〔答〕：（一）農藥有效成分的高低是為了便於配製成晶。殺虫效果主要在加水希釋後有效成分濃度的高低，如濃度相同，則殺虫效果相同。

例如：五〇%的農藥加水一、〇〇〇倍可殺死害虫，如以二〇%的農藥使用時，則加水四〇〇倍，其希釋後有效成分皆為五〇 P.P.M.，殺虫效果相同。


（2）水稻中的三角草可使用丁基拉草（商品名稱「馬上除」）來殺除。

（3）四大生M四五使用於水稻，對水稻病害並無有效的作用，但可能供給鋅及錳兩種微量元素。

（4）水稻開花期，均不宜使用任何藥物，以免產生授粉不全現象。（廖龍盛）

臺灣銀行綜合存款 為您提供
綜合服務

綜合存款存摺



臺灣銀行營業部及各地分行承辦
儲蓄信託

農藥解毒

〔問〕：(1)「巴姆」的效力是否在解毒？牛及蜜蜂發生中毒，是否有效？

(2)使用農藥後的殘物，很多人亂丟，應如何處理？

(3)防治病蟲害農藥中，有無對天敵及蜜蜂無害的？(西螺鎮鹿場里九號邱溪泉)

〔答〕：(1)「巴姆」是一種農藥解毒劑，專門治療有機磷及氨基酸塩農藥中毒用的，如發生農藥中毒可向各地農會領用。

(2)「巴姆」農藥解毒劑要在中毒發生以後才使用，對動物(如牛)發生有機磷及氨基酸塩農藥中毒亦有效。對於蜜蜂，不知效果如何。

(3)殺蟲劑農藥具有殺蟲作用，當然對天敵及蜜蜂有影響，只不過各種農藥藥性不同，毒害作用不同而已。(廖龍盛)

猪水腫病

〔問〕：我有窝小仔豬，離奶約二〇天左右，突然眼腫、頭大、後腿痙攣、出氣臭而有嘶嘶聲、大便乾又黑、腰弓形、廢食。據獸醫說是「水腫」，請問是否水腫呢？應如何預防及治療？(高雄甲仙關山村中和巷八號徐尚龍)

〔答〕：所述的病還沒有確實溫

白，過去有人認為是腸毒血症、中毒、過敏症、營養障礙或病毒感染等，但近來大家均認為是溶血性大腸菌所引起的腸毒血症較為妥當。

水腫病最易發生於離乳不久或免疫後，尤其營養良好的仔豬。死豬解剖可以看到頭部及結腸粘膜下水腫，有時看不到水腫現象，但腹水、胸水及心包水普遍增加，有絲狀纖維素。

水腫病的病因為豬舍污染了溶血性大腸桿菌。小豬如被感染，一胎中一部分或半數會發病，有的敗血症急症死亡，無法醫治，有的變成發育不良。

治療法：輕症者稍有治療效果，可使用氯黴素，並用長效性磺胺劑(內服或注射)及維生素C等。

預防：(1)仔豬從離乳前後一直到完成豬瘟免疫(六星期時)為止，飼料中應添加氯黴素或四環素(金黴素、土黴素)、福來頓等以抑制溶血性大腸桿菌的繁殖。

(2)此病對於使用高蛋白營養良好的仔豬最易發生，所以常發生此病的豬場，到了會發生月齡時，應改換飼料。

據台灣的經驗，即將發生此病的月齡達到之前，將高蛋白的飼料改換低蛋白飼料，約二~三天後再改換原來的高蛋白飼料，四~五日後，再改低蛋白飼料，二~三天後，再改高蛋白飼料以渡過危險期。此種方法預防效果良好。

(3)此病病因是大腸桿菌的傳染，所以發病時需要徹底消毒，可以碱水洗刷後，用一般消毒法或以火燒燒即可。(張聯欣)

強力白粉克乳劑 37.4%

讚就是讚!!

用過的人都這麼說



黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓

電話：(02) 3816895

現貨供應：山本農藥行 屏東市復興南路100~5號 TEL.24401

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、荷蓮豆、蔬菜等一般果樹白粉病特效藥，敬請愛用本劑