

農業信箱



農藥藥效

〔問〕：（一）短期蔬菜（

葉菜類）使用加保扶粒劑後

，須經幾天才可摘食？

（二）農藥有效成分的高低

（例如五〇%與二〇%），

殺虫效果相同嗎？

紅甘蔗蟲害

〔問〕：（一）紅甘蔗蟲害應該如何防治？

〔答〕：（一）蔗園主要管理工作是那些？（

南投水里鄉民和村忠信巷四一二二號

林其文）

〔答〕：（二）紅甘蔗的蟲害防治：

（1）螟蟲：應割除枯心，以殺死莖

中幼虫為原則。防治白螟蟲，可刮除

葉背卵塊，置於袋中燒毀。

（二期紅甘蔗的紫螟蟲，亦可配

合水稻螟蟲防治，噴施「一品松」（

E.P.N.）或「撲滅松」（Sumithion

）來防治。

（2）綿蚜蟲可噴施五〇%「馬拉松

」（Malathion）或二五%「滅賜松

」乳劑（Metasystox）一、〇〇〇倍

液施。

（3）金針虫、白蟻、蔗龜、鋸天牛

等可施用「飛布達」（Heptachlor）

粉劑，每公頃四五九〇公斤，於種

植前翻入植溝二五公分深土中，再種

蔗。

（二）紅甘蔗種植後至收穫前的蔗園

管理工作，有補植、中耕、除草、施肥、入土、培土、灌溉、排水、剝葉

、病蟲、鼠害防治、盜損防止等。（

林宗然）

羊角草）在水稻生育中，可使用那一類殺草劑？

〔問〕：（一）「大生M四五」噴於水稻有什麼作用？

〔答〕：（一）水稻開花期可否噴微量元素，對受粉率有無影響？

（桃園縣平鎮鄉東勢村金雞湖三

一號曾盛溢）

〔答〕：（一）加保扶粒劑是滲透性農藥，因此在使用後需經二十一天才可採收。

〔答〕：（一）農藥有效成分的高低是為了便於配製成晶。殺虫效果主要在加水希釋後有效成分濃度的高低，如濃度相同，則殺虫效果相同。

〔答〕：（一）例如：五〇%的農藥加水一、〇〇〇倍可殺死害蟲，如以二〇%的農藥使用時，則加水四〇〇倍，其希釋後有效成分皆為五〇 P.P.M.，殺虫效果相同。

〔答〕：（一）水稻中的三角草可使用丁基拉

草（商品名稱「馬上除」）來殺除。

〔答〕：（一）四大生M四五使用於水稻，對水稻病害並無有效的作用，但可能供給

鋅及錳兩種微量元素。

〔答〕：（一）水稻開花期，均不宜使用任何藥物，以免產生授粉不全現象。（廖龍盛）

臺灣銀行綜合存款 為您提供
綜合服務

定期存款

隨時可在定存九折內

存取方便的

定期存款

包括活期存款

活期儲蓄存款

定期儲蓄存款

綜合服務

隨時可在定存九折內

存取方便的

定期存款

包括活期存款

活期儲蓄存款

定期儲蓄存款

簡便貸款

隨時可在定存九折內

存取方便的

定期存款

包括活期存款

活期儲蓄存款

定期儲蓄存款

臺灣銀行綜合存款存摺

臺灣銀行營業部及各地分行承辦
儲蓄信託