

# 觀果植物

## 鋪地蜈蚣與火刺木

在園藝植物中，薔薇科的種類繁多而又是非常重要的一個大科。或為果樹、或為花木與園景植物，都具有很高的利用價值。鋪地蜈蚣與火刺木是薔薇科中的兩個屬，大多是低矮灌木，而且都具有醜麗的果實，適合於用作盆栽材料，也是很受人們所喜愛的觀果類植物。

### 鋪地蜈蚣

鋪地蜈蚣 (*Cotoneaster*) 在溫帶地方分布很廣，產歐洲、亞洲、北非及美洲，共約六十餘種，其中約四十五種分布喜馬拉雅、我國西部至華中地域，本省高山產兩種。

一般性質為常綠或落葉性灌木，花白色或淡紅色，數花着生為繖房花序，有時為單生花。果實球形、紅色或黑色。紅果艷美可愛，兼可賞花觀果，宜作庭園栽培，將樹形作適當的修整與誘引，作成盆景，尤為美觀。

本屬灌木，性耐乾旱，野生者常發生於山間岩石地，亦有具匍匐性的種類，故為布置岩石園的理想植物材料。

具有觀賞價值的主要種類有下列多種——

鋪地蜈蚣 (*C. microphylla* Wall.)：常綠矮灌木，葉卵形，表面暗綠色，有光澤。春開白色小花，單生或兩三朵集生。秋結球形果實

，鮮紅美觀。

本種原產喜馬拉雅、尼泊爾及我國雲南一帶，因其為常綠性園景植物，在庭園栽植，可經冬不凋。美國在早期即已引進栽培，日本方面則在一八二四年自英國引進。

株高可達一公尺，枝條密生，且多為匍匐性，適合於作懸崖式盆景及岩石園栽植。

作為地被植物，或在土坡、壁面栽植，兼具美化環境及水土保持及重效果。

繁殖方法：播種、插木、嫁接均可。

山米麻 (*C. salicifolia* Franch.)：常綠或半常綠灌木，高三至五公尺，樹皮、樹枝及葉之中肋均略帶紅色。

枝細而柔軟，伸長擴展或下垂接地，形成拱門狀。花白色，成繖房花序密生。

果實略呈球形、鮮紅色，有光澤。六月開花，十月果熟。

本種原產我國西南地方四川及雲南諸省。一九〇八年引進美國作庭園木栽培。

稍後日本亦引進栽培觀賞。變種有毛葉山米麻及小葉山米麻等多種。繁殖栽培方法与鋪地蜈蚣相同。

瓦氏鋪地蜈蚣 (*C. watereri* Hort.)：本種為喜馬拉雅鋪地蜈蚣

(*C. frigida*) 與瓦氏鋪地蜈蚣 (*C. henryana*) 之雜交種。

常綠性，高可達五公尺，性質強健，在歐洲庭園常見有栽培，多誘引於牆垣或廊柱，結果較大而多。

每一花序着果約二十個，極為美觀，為一優良園藝種，唯在東亞各國不多見。

性好日光充足，宜在排水良好而冷涼處所栽培。

台灣產的鋪地蜈蚣屬植物有兩種，即玉山鋪地蜈蚣與高山鐵樹，均在高山自生。玉山鋪地蜈蚣分布台北、新竹、台中、南投、花蓮、高山鐵樹分布台中、台東、中央山脈潤葉樹林中。

如能就地取材，自山野採集，培植作園景或盆景材料，作觀果植物欣賞也很好。

玉山鋪地蜈蚣 (*C. morrissonensis* Hay.)：半落葉性灌木，全株呈匍匐伸展。花白色，單一頂生。

果實為壺形漿果，熟時呈紅色。高山鐵樹 (*C. konishii* Hay.)：落葉灌木或小喬木，葉菱形狀卵形。

花白色，成聚繖花序頂生。漿果橢圓形。

在希臘語中 *pyr* 為火焰，*acanthos* 是刺，合稱為火刺木，非常恰當。



高山鐵樹



台東火刺木

### 火刺木

火刺木為常綠小灌木，枝有刺，果實朱紅或橙黃色，其屬名 *Pyracantha*。

在希臘語中 *pyr* 為火焰，*acanthos* 是刺，合稱為火刺木，非常恰當。

火刺木原歸在鋪地蜈蚣屬內，一八四七年始分出，成爲一獨立屬。與鋪地蜈蚣的不同點是，枝有刺，葉邊有鋸齒，繖房狀花序，果實內有五粒種子。

火刺木屬約有七種，分佈歐洲東南部、喜馬拉雅及我國西南，台灣產兩種，一種爲台東火刺木，產東部花蓮至台東狹長平地，甚爲普遍，另一種爲蘭嶼火刺木。

火刺木作爲庭園樹、盆景、切花等均宜，因其枝條帶刺，栽植作綠籬

生垣者也很多。生長迅速，花與果均具觀賞價值。

**火刺木** (*Pyracantha angustifolia* Schneid.)：常綠灌木，高約三公尺，枝細長，密生，枝橫向擴張，有時幾成平展，幼枝上密生黃褐色絨毛，短枝先端呈刺狀。葉互生，狹長橢圓形。

花白色，五、六月間開花。果實爲核果，扁球形，橙黃色，有光澤，帶有綠色的宿存萼，狀如小型橘子，極爲美觀。果實內有五粒帶稜角的種子。

本種原產我國雲南，一八八九年傳入歐洲，現今在歐美日本各地，廣爲栽培。

火刺木不耐移植，但插木繁殖，成活率很高。如用種子繁殖，生長良好者，經二年即可開花。

據英國倫敦邱植物園的記錄，實生八年，高達四公尺。

又據魯頓氏的報告，其壽命可達一百二十年。

**緋紅火刺木** (*P. coccinea* Borkh.)：常綠灌木，高二~六公尺，枝有銳短刺。

葉互生，狹倒卵形，葉邊有細鈍鋸齒。繖房花序着生多數小花，花白色，五、六月開放。

果球形，緋紅色，自秋至冬不凋落，極爲美觀。

本種原產歐洲及西亞，因其耐寒力強，美國北部諸州庭園，廣爲栽培。聖經中



山木麻

記載之點燃的灌木即指此種。小枝生長不像前種密，作爲綠籬的效果，不如前種好。但是作庭園花木栽植，則極爲美觀。本省已有引進栽培。

插木或播種繁殖，在日照充足處所，生育良好。

**喜馬拉雅火刺木** (*P. crenulata* Roem.)：又稱印度火刺木。常綠灌木，與緋紅火刺木相似。

喜馬拉雅地方原產，葉較上二種稍大，葉柄有帶狀紅色。

花白色，果球形，鮮紅色，觀賞價值甚高。

繁殖法用插木或播種，生產多量苗木時，可採用播種法，春間條播，發芽後略施以肥料，至九月以一五×



樹齡15年的鋪地蜈蚣盆景

四五公分之間隔移植。

**台東火刺木** (*Pyracantha Kozumii* Rehd.)：常綠灌木，小枝先端常延長而爲刺。葉爲倒卵狀長橢圓形。

花五瓣白色，成聚繖花序頂生。果實爲球形，熟時紅色。

本種爲台灣固有種，東部一帶甚爲普通，可廣爲栽植作爲園景及庭園木，亦爲培養盆景的好材料。

栽培火刺木類，爲使結實纍纍而達到觀賞美麗果實之目的，必須作適當的剪定。

否則灌叢生長雜亂無章，樹形既不雅觀，結實亦少，這是栽培上應加注意的地方。