

農業信箱



椰子儲藏

〔問〕：我有一批椰子，欲儲藏三個月，請問如何保持外表顏色及內部品質？（彰化永靖鄉永東村東門路二三號黃清芳）

〔答〕：椰實若還未熟，可把它置於通風處儲存即可，但外表原有色澤會逐漸乾枯而無法保持。儲存期若超過一個月，果蒂部分會變成黑褐色，流出少許液汁，並逐漸潰爛而及於內部的種仁，使內部的椰汁變酸、變壞。

如椰實為充分成熟者（外皮呈現乾枯），只要保存在乾燥處，即不會影響到內部的品質。

不過在儲存期間，可能會有少數幾個種實，因已完成後熟作用而自動發芽。（劉正平）

花蓮種香蕉

〔問〕：(1)一公頃蕉園要用多少蕉苗？蕉苗宜向何處選購？

(2)香蕉從定植到收穫要多少時間？重要管理工作如何？

(3)目前種香蕉有無前途？

(4)香蕉宜種什麼品種？（花蓮縣玉里鎮中城里中山路六六號簡見明）

防治（尤其是葉斑病、象鼻虫等）、套袋、插立支柱等。

〔答〕：香蕉種植後有無利潤，很難斷言。但如好好經營（東部應注意風險），當能獲利。

花蓮地區目前香蕉面積已日漸減少，今後如不能集中栽培，形成集運單位，則合作社難於辦理外銷。

所以東部地區植蕉外銷，宜慎重考慮。

〔問〕：目前本省香蕉以北蕉及仙人蕉為主。（林俊彥）

紅甘蔗品種

〔問〕：(1)本省一般栽培的食用甘蔗是何種？

(2)宜何時種植？（南投水里鄉民和村忠信巷四二一、二號林基文）

〔答〕：(1)本省食用甘蔗俗稱紅甘蔗，為高貴種甘蔗 (*Saccharum officinarum*, L.) 所屬的天然品種，英名為 *Badila*。

紅甘蔗發現於新幾內亞島 (New Guinea)，原是熱帶地區栽培品種，所以澳洲昆士蘭及菲律賓栽培面積較多。

〔答〕：(1)目前坡地香蕉每公頃約種植一、二〇〇

一、四〇〇株。蕉苗最好向無萎縮病及黃葉病地區選購。

(2)香蕉從定植到收穫所

需時間，依種植地區、時期及管理方法而不同。普通坡

地約一年至一年四個月，平

地約一〇個月至一年。

種植後應注意施肥管理、病蟲害

防治（尤其是葉斑病、象鼻虫等）、

套袋、插立支柱等。

〔答〕：香蕉種植後有無利潤，很難斷言。但如好好經營（東部應注意風險），當能獲利。

花蓮地區目前香蕉面積已日漸減少，今後如不能集中栽培，形成集運單位，則合作社難於辦理外銷。

所以東部地區植蕉外銷，宜慎重考慮。

〔問〕：目前本省香蕉以北蕉及仙人蕉為主。（林俊彥）

紅甘蔗品種

〔問〕：(1)本省一般栽培的食用甘蔗是何種？

(2)宜何時種植？（南投水里鄉民和村忠信巷四二一、二號林基文）

〔答〕：(1)本省食用甘蔗俗稱紅甘蔗，為高貴種甘蔗 (*Saccharum officinarum*, L.) 所屬的天然品種，英名為 *Badila*。

紅甘蔗發現於新幾內亞島 (New Guinea)，原是熱帶地區栽培品種，所以澳洲昆士蘭及菲律賓栽培面積較多。

紅甘蔗特徵為莖黑紫色、臘層厚、節間膨脹形而較短、髓質充實、汁多質良，纖維少，糖分高，葉幅寬而下垂，葉鞘毛茸發達，葉片呈黃綠色

、芽倒卵圓形而寬，尖端帶圓。

在本省極少開花，與其他製糖甘

蔗藏然不同，極易辨認，不必担心品種混雜。

食用甘蔗因為世界栽培不普遍，所以目前除 *Badila* 外，還沒有其他的改良品種。

〔答〕：(1)紅甘蔗的種植時期與製糖甘蔗相同。

秋植在地力與灌漑正常的平地為七月下旬至九月上旬，其他地區為七月中旬至八月上旬。春植以二月底前為宜。（林宗然）

百香果枯萎

〔問〕：我於去年八月時在庭院栽種時計果（百香果），一直都長得很好，枝葉肥滿棚架，可是在四月初

，竟一株一株的枯萎。

約一星期，一株的葉子就全落下

，根部皮下呈褐色（正常者白色）。我家庭院下雨時不積水，且澆水也不會太濕。

我翻動庭院，也沒發現蟋蟀，葉子也沒受昆蟲為害。這是何因枯死的

？（台中市南屯區萬和路和仁巷一八號洪昭維）

〔答〕：庭園位置，一般多不通風，排水不良，土壤結實，土壤空氣

欠缺，最易引起植物的根腐病。所以

種植果樹時植穴宜挖深、挖大，藉以改善土壤條件。

〔問〕：(1)種蛋如何儲藏，才有的孵化力？

(2)梅雨期育雛，育成率常很低，這是何因？如何補救？（高市前金區中華三路二三一號孫進發）

〔答〕：(1)種蛋儲藏最適溫度為

一〇度C ~ 一二度C。如在零度C，儲存五天以上時，即有死胎的可能。

在二四度C以上，經過一星期時，亦會失去孵化效力。

〔問〕：(1)種蛋在夏天最好不要儲存一星期以上，在冬天不宜儲存十天以上，否則會影響孵化率。

(2)目前育雛方法科學化，受外界溫濕度影響少。梅雨期育雛，如保持

通風良好，墊料乾燥，育雛並不難，當然育成率會比春雛、秋雛差些，因

為此時換氣受阻礙，濕度高、蚊子多，所以如沒有特別需要，避免大量育雛。（廖清今）

土堆，高出地面，使種植後的果樹根部能高於地面，日後如因雨水沖刷，有露根情形時，再用土稍加覆蓋。

或在根部覆蓋草類亦可。如此可避免根腐病。

百香果（時計果）必需用不同的植株的花粉，行人工異株授粉，才可結果。

〔張振宙〕

種蛋儲藏

〔問〕：(1)種蛋如何儲藏，才有的孵化力？

(2)梅雨期育雛，育成率常很低，這是何因？如何補救？（高市前金區中華三路二三一號孫進發）

〔答〕：(1)種蛋儲藏最適溫度為

一〇度C ~ 一二度C。如在零度C，儲存五天以上時，即有死胎的可能。

在二四度C以上，經過一星期時，亦會失去孵化效力。

〔問〕：(1)種蛋在夏天最好不要儲存一星期以上，在冬天不宜儲存十天以上，否則會影響孵化率。

(2)目前育雛方法科學化，受外界溫濕度影響少。梅雨期育雛，如保持

通風良好，墊料乾燥，育雛並不難，當然育成率會比春雛、秋雛差些，因

為此時換氣受阻礙，濕度高、蚊子多，所以如沒有特別需要，避免大量育雛。（廖清今）