



枸杞用途多！

楊永裕

作為基肥，充分整地種植。種植期除七月、八月的盛夏外，均可種植。春季發芽前三

四月與五月六月及秋季九月十月為最適期。

成活後施用希釋人糞尿促進生長。立秋時以硫酸銨一公斤，過磷酸石灰〇·五公斤作追肥或視其生育情形適量施用人糞尿亦可。普通在摘葉後施用時會長出新葉，成果很好。

(3)繁殖：除七、八月以外，自春季三四月至秋季九十月間選擇長出較多新梢的枝條，以二十公分左右剪斷，扦插於無肥分的沙床，株距為十公分，經約二星期就可發芽。扦插至成活時期，白天需設覆蓋物遮陰，夜間或陰天及雨天均要除去覆蓋物。成活發根時，春插者需以極稀薄的硫酸銨或人糞尿作追肥，於秋季九、十月間定植。

秋插的苗應放置（此時為避免霜害，應作覆蓋物）至春期溫暖時，即自三四月至五六月定植。如在盛夏的七、八月種植，因為氣候太熱成活不良。

扦插時，如將插苗的基部塗布發根荷爾蒙劑，可促進發根。

除莖部可供扦插繁殖外，還可用根部繁殖。即將根部切斷適宜的長度，平置埋入土中種植，至春季時就會發芽，此時宜追施腐熟希釋水肥，促其生長旺盛。

其次有種子繁殖，即秋至冬季間的小果成熟時，用布包起揉碎洗水後即可。在早春播種經十天左右可發芽

，生長甚佳。但對子實品質的變異來說，採用無性繁殖是不會變質且容易繁殖。

病虫害防治

枸杞對於病虫害的抵抗力較強，但仍須注意病虫害的防治，此時容易發生無數的黑色肥虫及蝸牛的幼虫、瓢虫、毒虫等，噴害葉子成網狀。

病害有白粉病，在春天發芽時至盛夏，於降雨後發生在葉面。此需在發生前撒布大生粉劑四百倍，每星期撒布一次，連續三、四次就可防治。其他還有白銹病（粟粒大的小球斑點），發生於莖莖，此病不易防除，其在菊科植物也常發生。

扦插繁殖時，不要從已發病的母莖採扦插苗，防除法可用銅水和劑（淡綠色）粉末防除。除銅水和劑外還有八斗式生石灰波爾多液，大生粉等，效果均相似。白粉病發生株的病葉可用來養雞或做牛奶的飼料。

採收加工

(1)採收：果實的外皮變紅色以後即可收穫，土壤肥沃養分充足，每個葉腋能生果實七、八個，土壤肥力差的只能長出一個果實。由於果實的成熟期不一致，必須分批採收，通常每隔一天採收一次，採果的時間以每天露水乾後用手採果為合適。

(2)加工：果實的乾燥方法可分為晒果和烤果二種，晒果時果實攤擺在晾架上晾曬，七、八天就能曬乾。在下列雨連綿的季節採果後不得晾曬時必須進行烘烤，在大面積栽培枸杞時必須有火力烘乾的設備。

枸杞的品種有細葉及寬葉兩種。山地也有野生種。野生種的藥效與品質均比栽培的品種差。野生種與栽培種的區別，以葉形來分，普通栽培種的葉為長卵圓形，野生種稍為具有細長的特徵。

栽培法

(1)氣候、風土：枸杞為耐寒性強的作物，寒帶地區到處均可栽培。枸杞為多年生灌木，在冬季嚴寒時，無落葉而進入休眠期，至春季溫暖時，開始萌芽發生新梢，盛夏時在各節間開小形的花。於秋冷時結實如辣椒的小果，這就是「枸杞酒」所利用的枸杞果實。

枸杞對土質選擇不嚴，以結實情形來說，沙質壤土較好，粘質壤土會使葉生長過於繁茂。

良好的栽培適地為排水良好，陽光充足的土地。

(2)栽植：枸杞的種植株數，每十公畝一年生苗間隔四〇~五〇公分即需六、〇〇〇~七、〇〇〇株。種植後至第二年，初年二〇公分左右的小苗，至第二年時會長至七〇公分左右，因此需要盡量放寬距離種植，過於密植不但有害生長，而且容易發生病虫害。

種植時做一〇〇公分寬的畦，施用腐熟堆肥五十三公斤，硫酸銨三公斤，過磷酸石灰二公斤，鉀肥一公斤