

除 草 劑

孫定國·易筱琪

農 藥	化 學 名 稱	毒 性	劑 型	含 量	使 用 方 法 · 範 圍			商 品 名 稱	
								英 文	中 文
加速汰	3,5-Dinitro-4-tert-butyl-2,6-dimethyl-acetophenone	2,000 (小白鼠)	EC	20%	番茄田雜草 100倍 胡蘿蔔園雜草 100倍	15公升/公頃 10公升/公頃	Castight		
必滅草	(1)2,4,6-Trichlorophenyl-4-Aitrophenylether (2)3-(2-Methylphenoxy)-Pyridazine	MPP 568 (小白鼠) MO 10,800	G	7.7%	水田雜草	30公斤/公頃	Kusakiller Green		
替拔草	2,3,6-Trichlorobenzoic acid	1,500	S	20%	蔗田雜草	4公升/公頃	TBA Trysben		
草殺淨	2-Methylthio-4-ethylamino-6-isopropylamino-8-triazine	1,405	D	80%	蔗田雜草	2公斤/公頃	Ametryne Gesapax		
免拔草	(1)4-Chloro-2-methylphenoxy-acetic acid (MCPA) (2)2,3,6-trichlorobenzoic acid (TBA)	MCPA 770 TBA 1,500	S	20%	蔗田雜草	4公升/公頃	Peseo		
普拔根	2-Chloro-4,6-bis-isopropylamino-1,3,5-triazine	5,000	WP	50%	柳杉、杉木、松類苗圃雜草 300倍	20公斤/公頃	Propazine Gesamil		
可奪草	N-(3-trifluoromethylphenyl)-N',N'-dimethylurea	>800	WP	80%	鳳梨園雜草 250-350倍 3-4公斤/公頃(畦間噴藥) 4-6公斤/公頃(全面噴藥)		Cotoran Fluometuron		
甲基砷酸鈉	Monosodium methanearsonate	900	S	35.41%	柑桔園雜草 80倍	10公升/公頃	MSMA Daconate Bueno		
滅落寧	N-(4-bromo-3-chlorophenyl)-N'-methoxy-N-methylurea	>5,000	WP	50%	柑桔園雜草 150倍	6公斤/公頃	Maloran Chlorbromuron		
氟丙酸	Sodium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate	10,420-11,800	G	10%	造林地雜草	50公斤/公頃	Frenock		
甲 氧 基 護 谷	2,4-Dichloro-3'-methoxy-4'-nitrodiphenylether	33,000 (小白鼠)	G	7%	水田雜草	30公斤/公頃	X-52		
樂滅草	2-t-butyl-4-(2,4-dichloro-5-iso-propoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-5-one	4,600 (小白鼠)	G EC	2% 12%	水田雜草 水田雜草	30公斤/公頃 5-6公升/公頃	Ronstar G-315		
樂撲草	2,4-dichloro-phenyl pyrrolidynyl carboxylate	850 (小白鼠)	G	5%	水田雜草	30公斤/公頃	Lolop Phenopylate		
禾爾邦砷	(1)Norea 3-(hexahydro-4,7-methanoindan-5-yl)-1,1-dimethylurea (2)Monosodium acid methanearsonate (3)Related reaction products	Norea 4,600 (小白鼠) MSMA 1,800 (小白鼠)	EC	423%	棉田雜草 100-200倍	0.6公升/公頃	Herban M		

說明：(一)WP=可濕性粉劑。(二)S=溶液。(三)EC=乳劑。(四)D=粉劑。(五)ULV=超低容量劑。(六)G=粒劑。
 (七)毒性指小白鼠口服致死半量(LD₅₀)而言。例如某種動物100隻，每隻體重1公斤，若每隻攝取某種藥物5mg時即有50隻死亡，此動物的半數致死量即為LD₅₀=5mg/kg。為簡便起見，只記5數字。